THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

詳校
懸吐東レ詩世保元全

7913.9
4037
1941

	板	行	格	誤	正
卷一	六	右十一 十二	二十四	液	腋
			七	液	腋
			十七	液	腋
卷二	十七	右一	二十三	絡	絡
	二十四	，十	二	瘢	厥
	四十	，九	二十一	釘	錠
卷三	六十六	右十二	四	村	材
	八十	，七	四	風	毒

詳校懸吐 東醫壽世保元目錄

卷之一

性命論 卅七
四端論 廿六
擴充論 十七
臟腑論 十七
卷之二
醫源論 九
少陰人表熱病論 五十二
少陰人裏寒病論 六十七
泛論 廿四
經驗藥方 四十二 〇一
新定藥方 廿四 〇一
卷之三
少陽人表寒病論 四十五
少陽人裏熱病論 廿九
泛論 廿九
經驗藥方 十九 〇四
新定藥方 十七
卷之四
太陰人表寒病論 十一
太陰人裏熱病論 卅六
經驗藥方 舊本。十三

東184629

新定藥方 廿四

太陽人外感病論 以下舊本 四

太陽人內觸病論 十一

經驗藥方 十二

新定藥方 二。二

廣濟說 廿五

辨證論 廿五

總六百二十五條

卷一、九十七條
卷二、二百二十條
卷三、百四十三條
卷四、百六十五條

備考 舊本、甲午本
新本、庚子本

印本、辛丑本
性命論以下原本吐

醫源論以下今校懸
吐而覽者恕焉

東醫壽世保元目錄

東醫壽世保元卷之一

性命論

天機有四一曰地方二曰人倫三曰世會四曰天時

○人事有四一曰居處二曰黨與三曰交遇四曰事務

○耳聽天時目視世會鼻嗅人倫口味地方

○天時極蕩也世會極大也人倫極廣也地方極邇也

○肺達事務脾合交遇肝立黨與腎定居處

○事務克修也交遇克成也黨與克整也居處克治也

○頷有籌策臆有經綸臍有行檢腹有度量

○籌策不可驕也經綸不可矜也行檢不可伐也度量不可夸也

○頭有識見肩有威儀腰有材幹臀有方略

○識見必無奪也威儀必無侈也材幹必無懶也方略必無竊也

○耳目鼻口觀於天也肺脾肝腎立於人也頷臆臍腹行其知也
頭肩腰臀行其行也
○天時大同也事務各立也世會大同也交遇各立也人倫大同
也黨與各立也地方大同也居處各立也
○籌策博通也識見獨行也經綸博通也威儀獨行也行檢博通
也材幹獨行也度量博通也方略獨行也
○大同者天也各立者人也博通者性也獨行者命也
○耳好善聲目好善色鼻好善臭口好善味
○善聲順耳也善色順目也善臭順鼻也善味順口也
○肺惡惡聲脾惡惡色肝惡惡臭腎惡惡味
○惡聲逆肺也惡色逆脾也惡臭逆肝也惡味逆腎也
○頷有驕心臆有矜心臍有伐心腹有夸心

○驕心驕意也 矜心矜慮也 伐心伐操也 夸心夸志也

○頭有擅心肩有侈心腰有懶心臀有慾心

○擅心奪利也 侈心自尊也 懶心自卑也 慾心竊物也

○人之耳目鼻口好善無雙也 人之肺脾肝腎惡惡無雙也 人之頷臆臍腹邪心無雙也 人之頭肩腰臀怠心無雙也

○堯舜之行仁在於五千年前而至于今天下之稱善者皆曰堯舜則人之好善果無雙也 桀紂之行暴在於四千年前而至于今天下之稱惡者皆曰桀紂則人之惡惡果無雙也 以孔子之聖三千之徒受教而惟顏子三月不違仁其餘日月至焉而心悅誠服者只有七十二人則人之邪心果無雙也 以文王之德百年而後崩未洽於天下武王周公繼之然後大行而管叔蔡叔猶以至親作亂則人之怠行果無雙也

○耳目鼻口人皆可以爲堯舜頷臆臍腹人皆自不爲堯舜肺脾肝腎人皆可以爲堯舜頭肩腰臀人皆自不爲堯舜

○人之耳目鼻口好善之心以衆人耳目鼻口論之而堯舜未爲加一鞭也人之肺脾肝腎惡惡之心以堯舜肺脾肝腎論之而衆人未爲少一鞭也人皆可以爲堯舜者以此人之頷臆臍腹之中誣世之心每每隱伏也存其心養其性然後人皆可以爲堯舜之知也人之頭肩腰臀之下罔民之心種種暗藏也修其身立其命然後人皆可以爲堯舜之行也人皆自不爲堯舜者以此

○耳目鼻口之情行路之人大同於協義故好善也好善之實極公也極公則亦極無私也肺脾肝腎之情同室之人各立於擅利故惡惡也惡惡之實極無私也極無私則亦極公也頷臆臍腹之中自有不息之知如切如磋而驕矜伐夸之私心卒然敗之則自

棄其知而不能博通也而肩腰臀之下自有不息之行赫兮咺兮而奪倦懶竊之慾心卒然陷之則自棄其行而不能正行也
○耳目鼻口人皆知也頷臆臍腹人皆愚也肺脾肝腎人皆賢也
頭肩腰臀人皆不肖也
○人之耳目鼻口天也天知也人之肺脾肝腎人也人賢也我之
頷臆臍腹我自爲心而未免愚也我之免愚在我也我之頭肩腰
臀我自爲身而未免不肖也我之免不肖在我也
○天生萬民性以慧覺萬民之生也有慧覺則生無慧覺則死慧
覺者德之所由生也
○天生萬民命以資業萬民之生也有資業則生無資業則死資
業者道之所由生也
○仁義禮智忠孝友悌諸般百善皆出於慧覺士農工商田宅邦

國諸般百用皆出於資業
○慧覺欲其兼人而有教也資業欲其廉己而有功也慧覺私小者雖有其傑巧如曹操而不可爲教也資業橫濫者雖有其雄猛如秦王而不可爲功也
○好人之善而我亦知善者至性之德也惡人之惡而我必不行惡者正命之道也知行積則道德也道德成則仁聖也道德非他知行也性命非他知行也
○或曰舉知而論性可也而舉行而論命何義耶曰命者命數也善行則命數自美也惡行則命數自惡也不待卜筮而可知也詩云永言配命自求多福卽此義也
○或曰吾于之言曰耳聽天時目視世會鼻嗅人倫口味地方耳之聽天時目之視世會則可也而鼻何以嗅人倫口何以味地方

曰處於人倫察人外表默探各人才行之賢不肖者此非嗅耶
處於地方均嘗各處人民生活之地利者此非味耶
○存其心者責其心也心體之明暗雖若自然而責之者清不責
者濁馬之心覺黠於牛者馬之責心黠於牛也鷹之氣勢猛於鴟
者鷹之責氣猛於鴟也心體之清濁氣宇之強弱在於牛馬鴟鷹
者以理推之而猶然況於人乎或相倍蓰或相千萬者豈其生而
輒得茫然不思居然自至而然哉

四端論

人稟臟理有四不同肺大而肝小者名曰太陽人肝大而肺小者
名曰太陰人脾大而腎小者名曰少陽人腎大而脾小者名曰少
陰人
○人趍心慾有四不同棄禮而放縱者名曰鄙人棄義而偷逸者

名曰懦人棄智而飾私者名曰薄人棄仁而極慾者名曰貪人

○五臟之心中央之太極也五臟之肺脾肝腎四維之四象也中央之太極聖人之太極高出於衆人之太極也四維之四象聖人之四象旁通於衆人之四象也

○太少陰陽之臟局短長四不同中有一大同天理之變化也聖人與衆人一同也鄙薄貪懦之心地清濁四不同中有萬不同人慾之閣狹也聖人與衆人萬殊也

○太少陰陽之短長變化一同之中有四偏聖人所以希天也鄙薄貪懦之清濁閣狹萬殊之中有一同衆人所以希聖也

○聖人之臟四端也衆人之臟亦四端也以聖人一四端之臟處於衆人萬四端之中聖人者衆人之所樂也聖人之心無慾也衆人之心有慾也以聖人一無慾之心處於衆人萬有慾之中衆人

者聖人之所憂也

○然則天下衆人之臟理亦皆聖人之臟理而才能亦皆聖人之才能也以肺脾肝腎聖人之才能而自言曰我無才能云者豈才能之罪哉心之罪也

○浩然之氣出於肺脾肝腎也浩然之理出於心也仁義禮智四臟之氣擴而充之則浩然之氣出於此也鄙薄貪懦一心之慾明而辨之則浩然之理出於此也

○聖人之心無慾云者非清淨寂滅如老佛之無慾也聖人之心滾憂天下之不治故非但無慾也亦未暇及於一己之慾也滾憂天下之不治而未暇及於一己之慾者必學不厭而教不倦也學不厭而教不倦者卽聖人之無慾也毫有一己之慾則非堯舜之心也暫無天下之憂則非孔孟之心也

○太陽人哀性遠散而怒情促急哀性遠散則氣注肺而肺益盛怒情促急則氣激肝而肝益削太陽之臟局所以成形於肺大肝小也少陽人怒性宏抱而哀情促急怒性宏抱則氣注脾而脾益盛哀情促急則氣激腎而腎益削少陽之臟局所以成形於脾大腎小也太陰人喜性廣張而樂情促急喜性廣張則氣注肝而肝益盛樂情促急則氣激肺而肺益削太陰之臟局所以成形於肝大肺小也少陰人樂性潑確而喜情促急樂性潑確則氣注腎而腎益盛喜情促急則氣激脾而脾益削少陰之臟局所以成形於腎大脾小也

○肺氣直而伸脾氣栗而包肝氣寬而緩腎氣溫而畜

○肺以呼肝以吸肝肺者呼吸氣液之門戶也脾以納腎以出脾者出納水穀之府庫也

○哀氣直升怒氣橫升喜氣放降樂氣陷降

○哀怒之氣上升喜樂之氣下降上升之氣過多則下焦傷下降之氣過多則上焦傷

○哀怒之氣順動則發越而上騰喜樂之氣順動則緩安而下墜哀怒之氣陽也順動則順而上升喜樂之氣陰也順動則順而下降

○哀怒之氣逆動則暴發而並於上也喜樂之氣逆動則浪發而並於下也上升之氣逆動而並於上則肝腎傷下降之氣逆動而並於下則脾肺傷

○頻起怒而頻伏怒則腰脊頻迫而頻蕩也腰脊者肝之所注着處也腰脊迫蕩不定則肝其不傷乎發喜而作收喜則胷腹作閟而作狹也胷腹者脾之所住着處也胷腹閟狹不定則脾其不

傷乎忽動哀而忽止哀則脊曲忽屈而忽伸也脊曲者腎之所住着處也脊曲屈伸不定則腎其不傷乎憂得樂而憂失樂則背顧暴揚而暴抑也背顧者肺之所住着處也背顧抑揚不定則肺其不傷乎

○太陽人有暴怒滾哀不可不戒少陽人有暴哀滾怒不可不戒太陰人有浪樂滾喜不可不戒少陰人有浪喜滾樂不可不戒

○皐陶曰都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬

○三復大禹之訓而欽仰之曰帝堯之喜怒哀樂每每中節者以其難於知人也大禹之喜怒哀樂每每中節者以其不敢輕易於知人也天下喜怒哀樂之暴動浪動者都出於行身不誠而知人

不明也知人帝堯之所難而大禹之所吁也則其誰沾沾自喜乎蓋亦益反其誠而必不可輕易取舍人也

○雖好善之心偏急而好善則好善必不明也雖惡惡之心偏急而惡惡則惡惡必不周也天下事宜與好人做也不與好人做則喜樂必煩也天下事不宜與不好人做也與不好人做則哀怒益煩也

○哀怒相成喜樂相資哀性極則怒情動怒性極則哀情動樂性極則喜情動喜性極則樂情動太陽人哀極不濟則忿怒激外少陽人怒極不勝則悲哀動中少陰人樂極不成則喜好不定太陰人喜極不服則後樂無厭如此而動者無異於以刀割臟一次大動十年難復此死生壽夭之機關也不可不知也

○太少陰陽之臟局短長陰陽之變化也天稟之已定固無可論

天稟已定之外又有短長而不全其天稟者則人事之修不修而命之傾也不可不慎也

○太陽人怒以一人之怒而怒千萬人其怒無術於千萬人則必難堪千萬人也少陰人喜以一人之喜而喜千萬人其喜無術於千萬人則必難堪千萬人也少陽人哀以一人之哀而哀千萬人其哀無術於千萬人則必難堪千萬人也太陰人樂以一人之樂而樂千萬人其樂無術於千萬人則必難堪千萬人也

○太陽少陽人但恆戒哀怒之過度而不可強做喜樂虛動不及也若強做喜樂而煩數之則喜樂不出於眞情而哀怒益偏也太陰少陰人但恆戒喜樂之過度而不可強做哀怒虛動不及也若強做哀怒而煩數之則哀怒不出於眞情而喜樂益偏也

○喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和喜怒哀樂未發

而恆戒者此非漸近於中者乎喜怒哀樂已發而自反者此非漸近於節者乎

擴充論

太陽人哀性遠散而怒情促急哀性遠散者太陽之耳察於天時而哀衆人之相欺也哀性非他聽也怒情促急者太陽之脾行於交遇而怒別人之侮己也怒情非他怒也少陽人怒性宏抱而哀情促急怒性宏抱者少陽之目察於世會而怒衆人之相侮也怒性非他視也哀情促急者少陽之肺行於事務而哀別人之欺己也哀情非他哀也太陰人喜性廣張而樂情促急喜性廣張者太陰之鼻察於人倫而喜衆人之相助也喜性非他嗅也樂情促急者太陰之腎行於居處而樂別人之保己也樂情非他樂也少陰人樂性滾確而喜情促急樂性滾確者少陰之口察於地方而樂

衆人之相保也樂性非他味也喜情促急者少陰之肝行於黨與而喜別人之助己也喜情非他喜也

○太陽之耳能廣博於天時而太陽之鼻不能廣博於人倫太陰之鼻能廣博於人倫而太陰之耳不能廣博於天時少陽之目能廣博於世會而少陽之口不能廣博於地方少陰之口能廣博於地方而少陰之目不能廣博於世會

○太陽之脾能勇統於交遇而太陽之肝不能雅立於黨與少陰之肝能雅立於黨與而少陰之脾不能勇統於交遇少陽之肺能敏達於事務而少陽之腎不能恆定於居處太陰之腎能恆定於居處而太陰之肺不能敏達於事務

○太陽之聽能廣博於天時故太陽之神充足於頭腦而歸肺者大也太陽之嗅不能廣博於人倫故太陽之血不充足於腰脊而

歸肝者小也太陰之嗅能廣博於人倫故太陰之血充足於腰脊而歸肝者大也太陰之聽不能廣博於天時故太陰之神不充足於頭腦而歸肺者小也少陽之視能廣博於世會故少陽之氣充足於脊膂而歸脾者大也少陽之味不能廣博於地方故少陽之精不充足於胸脇而歸腎者小也少陰之味能廣博於地方故少陰之精充足於胸脇而歸腎者大也少陰之視不能廣博於世會故少陰之氣不充足於脊膂而歸脾者小也

○太陽之怒能勇統於交遇故交遇不侮也太陽之喜不能雅立於黨與故黨與侮也是故太陽之暴怒不在於交遇而必在於黨與也少陰之喜能雅立於黨與故黨與助也少陰之怒不能勇統於交遇故交遇不助也是故少陰之浪喜不在於黨與而必在於交遇也少陽之哀能敏達於事務故事務不欺也少陽之樂不能

恒定於居處故居處欺也是故少陽之暴哀不在於事務而必在於居處也太陰之樂能恒定於居處故居處保也太陰之哀不能敏達於事務故事務不保也是故太陰之浪樂不在於居處而必在於事務也

○太陽之交遇可以怒治之而黨與不可以怒治之也若遷怒於黨與則無益於黨與而肝傷也少陰之黨與可以喜治之而交遇不可以喜治之也若遷喜於交遇則無益於交遇而脾傷也少陽之事務可以哀治之而居處不可以哀治之也若遷哀於居處則無益於居處而腎傷也太陰之居處可以樂治之而事務不可以樂治之也若遷樂於事務則無益於事務而肺傷也

○太陽之性氣恒欲進而不欲退少陽之性氣恒欲舉而不欲措太陰之性氣恒欲靜而不欲動少陰之性氣恒欲處而不欲出

○太陽之進量可而進也自反其材而不莊不能進也少陽之舉量可而舉也自反其力而不固不能舉也太陰之靜量可而靜也自反其知而不周不能靜也少陰之處量可而處也自反其謀而不弘不能處也

○太陽之情氣恆欲爲雄而不欲爲雌少陰之情氣恆欲爲雌而不欲爲雄少陽之情氣恆欲外勝而不欲内守太陰之情氣恆欲内守而不欲外勝

○太陽之人雖好爲雄亦或宜雌若全好爲雄則放縱之心必過也少陰之人雖好爲雌亦或宜雄若全好爲雌則偷逸之心必過也少陽之人雖好外勝亦宜内守若全好外勝則偏私之心必過也太陰之人雖好内守亦宜外勝若全好内守則物慾之心必過也

○太陽人雖至愚其性傻傻然猶延納也雖至不肖人之善惡亦知之也少陽人雖至愚其性恢恢然猶式度也雖至不肖人之知愚亦知之也太陰人雖至愚其性卓卓然猶教誘也雖至不肖人之勤惰亦知之也少陰人雖至愚其性坦坦然猶撫循也雖至不肖人之能否亦知之也

○太陽人謹於交遇故恒有交遇生疎人慮患之怒心此心出於秉彝之敬心也莫非至善而輕於黨與故每爲親熟黨與人所陷而偏怒傷臟以其擇交之心不廣故也

○少陰人謹於黨與故恒有黨與親熟人擇交之喜心此心出於秉彝之敬心也莫非至善而輕於交遇故每爲生疎交遇人所誣而偏喜傷臟以其慮患之心不周故也

○少陽人重於事務故恒有出外興事務之哀心此心出於秉彝

之敬心也莫非至善而不謹於居處故每爲主內做居處人所陷而偏哀傷臟以其重外而輕內故也

○太陰人重於居處故恆有主內做居處之樂心此心出於秉彝之敬心也莫非至善而不謹於事務故每爲出外興事務人所誣而偏樂傷臟以其重內而輕外故也

○太陰之頷宜戒驕心太陰之頷若無驕心絕世之籌策必在此也少陰之臆宜戒矜心少陰之臆若無矜心絕世之經綸必在此也太陽之臍宜戒伐心太陽之臍若無伐心絕世之行檢必在此也少陽之腹宜戒夸心少陽之腹若無夸心絕世之度量必在此也

○少陰之頭宜戒奪心少陰之頭若無奪心大人之識見必在此也太陰之肩宜戒侈心太陰之肩若無侈心大人之威儀必在此

也少陽之腰宜戒懶心少陽之腰若無懶心大人之材幹必在此也太陽之臀宜戒竊心太陽之臀若無竊心大人之方略必在此也

臟腑論

肺部位在頤下背上胃脘部位在頷下胷上故背上胷上以上謂之上焦脾部位在臍胃部位在膈故臍膈之間謂之中上焦肝部位在腰小腸部位在臍故腰臍之間謂之中下焦腎部位在腰脊下大腸部位在臍腹下故脊下臍下以下謂之下焦

○水穀自胃脘而入于胃自胃而入于小腸自小腸而入于大腸自大腸而出于肛門者水穀之都數停留於胃而薰蒸爲熱氣消導於小腸而平淡爲凉氣熱氣之輕清者上升於胃脘而爲温氣凉氣之質重者下降於大腸而爲寒氣

○胃脘通於口鼻故水穀之氣上升也大腸通於肛門故水穀之氣下降也胃之體廣大而包容故水穀之氣停畜也小腸之體狹窄而屈曲故水穀之氣消導也

○水穀溫氣自胃脘而化津入于舌下爲津海津海者津之所舍也津海之清氣出于耳而爲神入于頭腦而爲膩海膩海者神之所舍也膩海之膩汁清者內歸于肺濁滓外歸于皮毛故胃脘與舌耳頭腦皮毛皆肺之黨也

○水穀熱氣自胃而化膏入于膻間兩乳爲膏海膏海者膏之所舍也膏海之清氣出于目而爲氣入于背膂而爲膜海膜海者氣之所舍也膜海之膜汁清者內歸于脾濁滓外歸于筋故胃與兩乳目背膂筋皆脾之黨也

○水穀涼氣自小腸而化油入于臍爲油海油海者油之所舍也

油海之清氣出于鼻而爲血入于腰脊而爲血海血海者血之所舍也血海之血汁清者內歸于肝濁滓外歸于肉故小腸與臍鼻腰脊肉皆肝之黨也

○水穀寒氣自大腸而化液入于前陰毛際之內爲液海液海者液之所舍也液海之清氣出于口而爲精入于胸胱而爲精海精海者精之所舍也精海之精汁清者內歸于腎濁滓外歸于骨故大腸與前陰口胸胱骨皆腎之黨也

○耳以廣博天時之聽力提出津海之清氣充滿於上焦爲神而注之頭腦爲膩積累爲膩海目以廣博世會之視力提出膏海之清氣充滿於中上焦爲氣而注之背膂爲膜積累爲膜海鼻以廣博人倫之嗅力提出油海之清氣充滿於中下焦爲血而注之腰脊爲凝血積累爲血海口以廣博地方之味力提出液海之清氣

充滿於下焦爲精而注之膀胱爲凝精積累爲精海

○肺以鍊達事務之哀力吸得膩海之清汁入于肺以滋肺元而內以擁護津海鼓動其氣凝聚其津脾以鍊達交遇之怒力吸得膜海之清汁入于脾以滋脾元而內以擁護膏海鼓動其氣凝聚其膏肝以鍊達黨與之喜力吸得血海之清汁入于肝以滋肝元而內以擁護油海鼓動其氣凝聚其油腎以鍊達居處之樂力吸得精海之清汁入于腎以滋腎元而內以擁護液海鼓動其氣凝聚其液

○津海之濁滓則胃脘以上升之力取其濁滓而以補益胃脘膏海之濁滓則胃以停畜之力取其濁滓而以補益胃油海之濁滓則小腸以消導之力取其濁滓而以補益小腸液海之濁滓則大腸以下降之力取其濁滓而以補益大腸

○膸海之濁濘則頭以直伸之力鍛鍊之而成皮毛膜海之濁濘則手以能收之力鍛鍊之而成筋血海之濁濘則腰以寬放之力鍛鍊之而成肉精海之濁濘則足以屈強之力鍛鍊之而成骨

○是故耳必遠聽目必大視鼻必廣嗅口必深味耳目鼻口之用深遠廣大則精神氣血生也淺近狹小則精神氣血耗也肺必善學脾必善問肝必善思腎必善辨肺脾肝腎之用正直中和則津液膏油充也偏倚過不及則津液膏油爍也

○膸海藏神膜海藏靈血海藏魂精海藏魄

○津海藏意膏海藏慮油海藏操液海藏志

○頭腦之膸海肺之根本也背膂之膜海脾之根本也腰脊之血海肝之根本也胳胱之精海腎之根本也

○舌之津海耳之根本也乳之膏海目之根本也臍之油海鼻之

根本也前陰之液海口之根本也

○心爲一身之主宰負隅背心正向膻中光明瑩徹耳目鼻口無所不察肺脾肝腎無所不付頷臆臍腹無所不誠頭手腰足無所不敬

東醫壽世保元卷之一

東醫壽世保元卷之二

醫源論

書曰若藥不瞑眩厥疾不瘳商高宗時已有瞑眩藥驗而高宗至於稱歎則醫藥經驗其來已久於神農黃帝之時其說可信於眞也而本草素問出於神農黃帝之手其說不可信於眞也何以言之神農黃帝時文字應無後世文字澆漓例法故也衰周秦漢以來扁鵲有名而張仲景具備得之始爲成家著書醫道始興張仲景以後南北朝隋唐醫繼之而至于宋朱肱具備得之著活人書醫道中興朱肱以後元醫李杲王好古朱震亨危亦林繼之而至于明李梴龔信具備得之許浚具備傳之著東醫寶鑑醫道復興蓋自神農黃帝以後秦漢以前病證藥理張仲景傳之魏晉以後隋唐以前病證藥理朱肱傳之宋元以後明以前病證藥理李梴

龔信許浚傳之若以醫家勤勞功業論之則當以張仲景朱肱許浚爲首而李梴龔信次之

○本草自神農黃帝以來數千年世閭流來經驗而神農時有本草殷時有湯液本草唐時有孟詵食療本草陳藏器本草拾遺宋時有龐安常本草補遺日華子本草元時有王好古湯液本草

○少陰人病證藥理張仲景庶幾乎昭詳發明而宋元明諸醫盡乎昭詳發明少陽人病證藥理張仲景半乎昭詳發明而宋元明諸醫庶幾乎昭詳發明太陰人病證藥理張仲景略得影子而宋元明諸醫太半乎昭詳發明太陽人病證藥理朱震亨略得影子而本草略有藥理

○余生於醫藥經驗五六千載後因前人之述偶得四象人臟腑性理著得一書名曰壽世保元原書中張仲景所論太陽病少陽

病陽明病太陰病少陰病厥陰病以病證名目而論之也余所論太陽人少陽人太陰人少陰人以人物名目而論之也二者不可混看又不可厭煩然後可以探其根株而採其枝葉也若夫脈法者執證之一端也其理在於浮沈遲數而不必究其奇妙之致也三陰三陽者辨證之同異也其理在於腹背表裏而不必求其經絡之變也

○古人以六經陰陽論病故張仲景著傷寒論亦以六經陰陽該病證而以頭痛身疼發熱惡寒脈浮者謂之太陽病證以口苦咽乾目眩耳聾胷脅滿寒熱往來頭痛發熱脈弦細者謂之少陽病證以不惡寒反惡熱汗自出大便秘者謂之陽明病證以腹滿時痛口不燥心不煩而自利者謂之太陰病證以脈微細但欲寐口燥心煩而自利者謂之少陰病證以初無腹痛自利等證而傷寒

六七日脈微緩手足厥冷舌卷囊縮者謂之厥陰病證六條病證中三陰病證皆少陰人病證也少陽病證即少陽人病證也太陽病證陽明病證則少陽人少陰人太陰人病證均有之而少陰人病證居多也古昔以來醫藥法方流行世間經歷累驗者仲景採掇而著述之蓋古之醫師不知心之愛惡所欲喜怒哀樂偏着者爲病而但知脾胃水穀風寒暑濕觸犯者爲病故其論病論藥全局都自少陰人脾胃水穀中出來而少陽人胃熱證藥間或有焉至於太陰人太陽人病情則全昧也

○岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脈挾鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得臥也三日少陽受之少陽主膽其脈循脅絡於耳故胷脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臟故可汗而已四日太陰受之太陰脈布

胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五臟六腑皆受病榮衛不行五臟不通則死矣

○兩感於寒者必不免於死兩感於寒者一日巨陽少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二日陽明太陰俱病腹滿身熱不飲食譫語三日少陽厥陰俱病耳聾囊縮而厥水漿不入口不知人六日死其死皆以六七日之間其愈皆以十日已上

○論曰靈樞素問假托黃帝異術幻惑無足稱道方術好事者之言容或如是不必深責也然此書亦是古人之經驗而五臟六腑經絡針法病證修養之辨多有所啓發則實是醫家格致之宗主而苗脈之所自出也不可全數其虛誕之罪而廢其啓發之功也

蓋此書亦古之聰慧博物之言方士淵源修養之述也其理有可考而其說不可盡信

○岐伯所論巨陽少陽少陰經病皆少陽人病也陽明太陰經病皆太陰人病也厥陰經病少陰人病也

少陰人腎受熱表熱病論

張仲景傷寒論曰發熱惡寒脈浮者屬表卽太陽證也

○太陽傷風脈陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔桂枝湯主之

○危亦林得效方曰四時瘟疫當用香蘇散

○龔信醫鑑曰傷寒頭痛身疼不分表裏證當用藿香正氣散

○論曰張仲景所論太陽傷風發熱惡寒者卽少陰人腎受熱表熱病也此證發熱惡寒而無汗者當用桂枝湯川芎桂枝湯香蘇

散芎歸香蘇散藿香正氣散發熱惡寒而有汗者此凵陽初證也
必不可輕易視之先用黃芪桂枝湯補中益氣湯升陽益氣湯三
日連服而汗不止病不愈則當用桂枝附子湯人參桂枝附子湯
升陽益氣附子湯

○張仲景曰太陽病脈浮緊發熱無汗而劒者自愈也

○太陽病六七日表證因在脈微而沈反不結胷其人如狂者以
熱在下焦小腹當滿小便自利者下血乃愈抵當湯主之

○太陽證身黃發狂小腹硬滿小便自利者血證宜抵當湯傷寒
小腹滿應小便不利今反利者以有血也

○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者自愈但小腹急結
者宜攻之宜桃仁承氣湯

○太陽病外證未除而數下之遂下利不止心下痞硬表裏不解

人參桂枝湯主之

○論曰此證其人如狂者腎陽困熱也小腹硬滿者大腸怕寒也二證俱見當先其急腎陽困熱則當用川芎桂枝湯黃芪桂枝湯八物君子湯升補之大腸怕寒則當用藿香正氣散香砂養胃湯和解之若外熱包裹冷而毒氣重結於內或將有養虎遺患之弊則當用巴豆丹下利一二度因以藿香正氣散八物君子湯和解而峻補之

○張仲景所論下焦血證卽少陰人脾局陽氣爲寒邪所掩抑而腎局陽氣爲邪所拒不能直升連接於脾局鬱縮胸脇之證也其人如狂者其人亂言也如見鬼狀者怳惚譫語也太陽病表證因在者身熱煩惱而惡寒之證間有之也太陽病外證除者身熱煩惱而惡寒之證都無之也此證益氣而升陽則得其上策也破血

而解熱則出於下計也太陽病外證未除而數下之遂下利不止云云者亦可見古人之於此證用承氣湯則下利不止故遂變其方而用抵當桃仁湯耳太陽病外證未除則陽氣其力雖有鬱抑猶能振寒而與寒邪相爭於表也若外證盡除則陽氣其力不能振寒而遂爲窮困縮伏之勢也攻下之藥何甚好藥而必待陽氣窮困縮伏之時而應用邪入參桂枝湯不亦晚乎

○張仲景曰婦人傷寒發熱經水適來適斷晝日明了夜則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

○陽明病口燥嗽水不欲嚥此必劒不可下

○陽明病不能食攻其熱必噦傷寒嘔多雖有陽明不可攻胃家實不大便若表未解及有半表者先以桂枝柴胡和解乃可下也

○論曰右諸證當用藿香正氣散香砂養胃湯八物君子湯

○張仲景曰陽明之爲病胃家實也問曰緣何得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便者此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明病也

○傷寒轉屬陽明其人濈濈然微汗出也

○傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒狂言如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脈弦者生脈濇者死

○論曰秦漢時醫方治法大便秘燥者有大黃治法無巳豆治法故張仲景亦用大黃大承氣湯治少陰人太陽病轉屬陽明其人濈然微汗出胃中燥煩實不大便五六日至十餘日日晡發潮熱不惡寒狂言如見鬼狀之時而用之則神效若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視用之於此則脈弦者生脈濇者死

蓋此方治少陰人太陽病轉屬陽明不大便五六日日晡發潮熱者可用而其他則不可用也仲景知此方有可用不可用之時候故亦能昭詳少陰人太陽陽明病證候也蓋仲景一心精力都在於探得大承氣湯可用時候故不可用之時候亦昭詳知之也仲景太陽陽明病藥方中惟桂枝湯人參桂枝湯得其彷彿而大承氣湯則置人死生於茫無津涯之中必求大承氣湯可用之時候而待其不大便五六日日晡發潮熱狂言時是豈美法也哉蓋少陰人病候自汗不出則脾不弱也大便秘燥則胃實也少陰人太陽陽明病自汗不出脾不弱者輕病也大便雖硬用藥則易愈也故大黃枳實厚朴芒硝之藥亦能成功於此時而劇者猶有半生半死若用八物君子湯升陽益氣湯與巴豆丹則雖劇者亦無脈弦者生脈濇者死之理也又太陽病表證因在時何不早用溫補

升陽之藥與己豆預圖其病而必待陽明病日晡發潮熱狂言時用升氣湯使人半生半死耶

○許叔微本事方曰一人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩手撮空直視喘急諸醫皆走此誠惡候仲景雖有證而無法但云脈弦者生脈濇者死謾且救之與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脈且微弦半月愈

○王好古海藏書曰一人傷寒發狂欲走脈虛數用柴胡湯反劇以蔘芪歸朮陳皮甘草煎湯一服狂定再服安睡而愈

○醫學綱目曰嘗治循衣摸床者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼瞤振脈代遂於補劑中略加桂亦振止脈和而愈

○成無己明理論曰潮熱屬陽明必於日晡時發者乃爲潮熱也陽明之爲病胃家實也胃實則譫語手足濈然汗出者此大便已

硬也譫語有潮熱承氣湯下之熱不潮者勿服
○朱震亨丹溪心法曰傷寒壞證昏沈垂死一切危急之證好人參一兩水煎一服而盡汗自鼻梁上出消消如水
○論曰右論皆以張仲景大承氣湯始作俑而可用不可用時候難知故紛紜多惑而始知張仲景之不可信也張仲景大承氣湯元是殺人之藥而非活人之藥則大承氣湯不必舉論此胃家實病不更衣發狂證當用巴豆全粒或用獨參八物君子湯或先用巴豆後用八物君子湯以壓之
○張仲景曰陽明病外證身熱汗自出不惡寒反惡熱
○傷寒陽明病自汗出小便數則津液內竭大便必難其脾爲約麻仁丸主之
○陽明病自汗出小便自利者此爲津液內竭大便雖硬不可攻

之宜用蜜導法通之

○陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

○李梴醫學入門曰汗多不止謂之亡陽如心痞胃煩面青膚瞤者難治色黃手足溫者可治凡汗漏不止眞陽脫亡故謂之亡陽其身必冷多成痺寒四肢拘急桂枝附子湯主之

○嘗治少陰人十一歲兒汗多亡陽病此兒勞心焦思素證有時以泄瀉爲憂而每飯時汗流滿面矣忽一日頭痛發熱汗自出大便秘燥以此兒素證泄瀉爲憂故頭痛身熱便秘汗出之熱證以其反於泄瀉寒證而曾不關心尋常治之以黃芪桂枝白芍藥等屬發表矣至于四五日頭痛發熱不愈六日平明察其證候則大便燥結已四五日小便赤澁二三匙而一晝夜間小便度數不過二三次不惡寒而發熱汗出度數則一晝夜間二三四次不均而

人中則或有時有汗或有時無汗汗流滿面滿體其證可惡始覺汗多亾陽證候眞是危證也急用巴豆一粒仍煎黃芪桂枝附子湯用附子一錢連服二貼以壓之至于未刻大便通小便稍清而稍多其翌日卽得病七日也以小兒附子太過之慮故以黃芪桂枝附子湯一貼分兩日服矣兩日後其兒亾陽證又作不惡寒發熱汗多而小便赤澁大便秘結如前面色帶青間有乾咳病勢叱前太甚其日卽得病九日也時則巳時末刻也急用巴豆一粒仍煎人蔘桂枝附子湯用人蔘五錢附子二錢連二貼以壓之至于日晡大便始通小便稍多而色赤則一也又用人蔘桂枝附子湯人蔘五錢附子二錢一貼服矣至于二更夜其兒側臥而頭不能舉自吐痰一二匙而乾咳仍止其翌日又用人蔘桂枝附子湯人蔘五錢附子二錢三貼食粥二三匙每用藥後則身清涼無汗小

便稍多而大便必通又翌日用此方二貼食粥半碗有餘身清涼自起坐房室中此日即得病十二日也此三日內身清涼無汗大便通小便清而多者連用附子二錢日二三貼之故也至于十三日又起步門庭而舉頭不能仰面懲前小兒附子太過之慮用黃芪桂枝附子湯用附子一錢每日二貼服至于七八日頭面稍得仰舉而面部浮腫又每日二貼服至于七八日頭面又得仰舉而面部浮腫亦減其後用此方每日二貼服自得病初至於病解前後一月餘用附子凡八兩矣

○張仲景曰陽明病有三病太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便胃中燥煩實大便難是也

○論曰張仲景所論陽明三病一曰脾約者自汗出小便利之證也二曰胃家實者不更衣大便難之證也三曰發汗利小便胃中

燥煩實者此亦胃家實也其實非三病也二病而已仲景意脾約云者津液漸竭脾之潤氣漸約之謂也胃家實云者津液已竭胃之全局燥實之謂也中古戰國秦漢之時醫家單方經驗其來已久汗吐下三法始爲盛行太陽病表證因在者或以麻黄湯發汗或以猪苓湯利小便或以承氣湯下之承氣湯下之則下利不止之證作矣麻黄湯猪苓湯發汗利小便則胃中燥煩實大便難之證作矣仲景有見於此故以脾約之自汗出自利小便者脾之潤氣漸約亦將爲胃燥實之張本矣然脾約自脾約也胃家實自胃家實也寧有其病先自脾約而後至於胃家實之理耶

○胃家實脾約二病如陰證之太陰少陰病虛實證狀顯然不同自太陽病表證因在時已爲兩路分歧元不相合太陽病表證因在而其人如狂者鬱狂之初證也陽明病胃家實不更衣者鬱狂

之中證也陽明病潮熱狂言微喘直視者鬱狂之末證也太陽病發熱惡寒汗自出者亾陽之初證也陽明病不惡寒反惡熱汗自出者亾陽之中證也陽明病發熱汗多者亾陽之末證也蓋鬱狂證都是身熱自汗不出也亾陽證都是身熱自汗出也

○陰證口中和而有腹痛泄瀉者太陰病也口中不和而有腹痛泄瀉者少陰病也陽證自汗不出而有頭痛身熱者太陽陽明病鬱狂證也自汗出而頭痛身熱者太陽陽明病亾陽證也陰證之太陰病陽證之鬱狂病有輕證重證也陰證之少陰病陽證之亾陽病有險證危證也亾陽少陰病自初痛已爲險證繼而爲危證也

○亾陽病證非但觀於汗也必觀於小便多少也若小便清利而自汗出則脾約病也此險證也小便赤澁而自汗出則陽明病發

熱汗多也此危證也然少陽人裏熱證太陰人表熱證亦有汗多而小便赤澁者宜察之不可誤藥

○胃家實病其始焉汗不出不惡寒但惡熱而其病垂危則濈然微汗出潮熱也濈然微汗出潮熱者表寒振發之力永竭故也胃竭之候也脾約病其始焉身熱汗自出不惡寒而若其病垂危則發熱汗多而惡寒也發熱汗多而惡寒者裏熱撐支之勢已窮故也脾絶之候也

○張仲景曰厥陰證手足厥冷小腹痛煩滿囊縮脈微欲絶宜當歸四逆湯

○凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也

○傷寒六七日尺寸脈微緩者厥陰受病也其證小腹煩滿而囊縮宜用承氣湯下之

○六七日脈至皆大煩而口噤不能言躁擾者必欲解也

○朱肱活人書曰厥者手足逆冷是也手足指頭微寒者謂之清此疾爲輕陰厥者初得病便四肢厥冷脈沈微而不數足多攣

○傷寒六七日煩滿囊縮尺寸俱微緩者足厥陰經受病也其脈微浮爲欲愈不浮爲難愈脈浮緩者必囊不縮外證必發熱惡寒爲欲愈宜桂麻各半湯若尺寸俱沈短者必囊縮毒氣入腹宜承氣湯下之速用承氣湯可保五生一死六七日脈微浮者否極泰來水升火降寒熱作而大汗解矣

○諸手足逆冷皆屬厥陰不可汗下然有須汗須下者謂手足逆冷時有溫時手足掌心必煖非正厥逆當消息之

○李梴曰舌卷厥逆冷過肘膝小腹絞痛三味參萸湯四順湯主之囊縮手足冷亦冷亦溫煩滿者大承氣湯主之

○論曰張仲景所論厥陰病初無腹痛下利等證而六七日猝然而厥手足逆冷則此非陰證之類也乃少陰人太陽傷風惡寒發熱汗自出之證正邪相持日久當解不解而變爲此證也此證當謂之太陽病厥陰證也此證不必用當歸四逆湯桂麻各半湯而當用參萸湯人參吳茱萸湯獨參八物湯不當用大承氣湯而當用巴豆

○凡少陰人外感病六七日不得汗解而死者皆死於厥陰也四五日觀其病勢用黃芩桂枝湯八物君子湯三四五貼預防可也

○朱肱曰厥陰病消渴氣上衝心心中疼熱飢不欲食食則吐蚘者雖有大熱忌下凉藥犯之必死蓋胃中有寒則蚘不安所而上膈大凶之兆也急用理中湯

○論曰此證當用理中湯日三四服又連日服或理中湯加陳皮

官桂白何首烏

○重病危證藥不三四服則藥力不壯也又不連日服則病加於少愈也或病愈而不快也連日服者或日再服或日一服或日三服或二三日連日服或五六日連日服或數十日連日服觀其病勢圖之

少陰人胃受寒裏寒病論

張仲景曰太陰之證腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛

○腹滿時痛吐利不渴者爲太陰宜四逆湯理中湯腹滿不減減不足言宜大承氣湯

○傷寒自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜用四逆湯

○太陰證腹痛自利不渴宜理中湯理中丸四順理中湯丸亦主

之
○論曰右證當用理中湯四順理中湯四逆湯而古方草根藥力不具備此證當用白何烏理中湯白何烏附子理中湯腹滿不減減不足言者有痼冷積滯也當用巴豆而不當用大承氣湯
○張仲景曰病發於陰而反下之因作痞傷寒嘔而發熱者若心下滿而不痛此爲痞半夏瀉心湯主之胃虛氣逆者亦主之
○下後下利日數十行穀不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃結熱乃胃中虛客氣上逆故也甘草瀉心湯主之
○太陰證下利清穀若發汗則必脹滿發汗後腹脹滿宜用厚朴半夏湯
○汗解後胃不和心下痞硬噫下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

○傷寒下利心下痞硬服瀉心湯後以他藥下之利不止與理中湯利益甚赤石脂禹餘粮湯主之

○論曰病發於陰而反下之云者病發於胃弱當用藿香正氣散而反用大黃下之之謂也麻黃大黃自是太陰人藥非少陰人藥則少陰人病無論表裏麻黃大黃汗下元非可論少陰人病下利清穀者積滯自解也太陰證下利清穀者當用藿香正氣散香砂養胃湯薑朮寬中湯溫胃而降陰少陰證下利清穀者當用官桂附子理中湯健脾而降陰

○藿香正氣散香砂六君子湯寬中湯蘇合元皆張仲景瀉心湯之變劑也此所謂青於藍者出於藍噫青雖自青若非其藍青何得青

○張仲景曰傷寒陰毒之病面青身痛如被杖五日可治七日不

治
○李梴曰三陰病深必變爲陰毒其證四肢厥冷吐利不渴靜踡而臥甚則咽痛鄭聲加以頭痛頭汗眼睛內痛不欲見光面唇指甲青黑身如被杖又此證面青白黑四肢厥冷多睡
○論曰右證當用人蔘桂皮湯人蔘附子理中湯
○張仲景曰傷寒直中陰經初來無頭痛無身熱無渴怕寒踡臥沈重欲眠唇青厥冷脈微而欲絕或脈伏宜四逆湯四逆者四肢逆冷也
○論曰嘗治少陰人直中陰經乾癯亂關格之病時屬中伏節候少陰人一人面部氣色或青或白如彈丸圈四五點成團起居如常而坐於房室中倚壁一身委靡無力而但欲寐問其這閒原委則曰數日前下利清水一二行仍爲便閉至今爲兩晝夜別無他

故云問所飲食則曰食麥飯云急用巴豆如意丹一半時刻其汗自人中穴出而達于面上下利一二度時當日暮觀其下利則青水中雜穢物而出終夜下利十餘行翌日平明至日暮又十餘行下利而清穀麥粒皆如黃豆大其病爲食滯故連三日絶不穀食日所食但進好熟冷一二碗至第三日平明病人面色則無不顯明而一身皆冷頭頸墜下去地二三寸而不能仰舉病證更重計出無聊仔細點檢病人一身則手足胸胱腰腹皆如冰冷臍下全腹堅硬如石而胃腹上中脘熱氣熏騰炙手可熱最爲可觀至第五日平朝一發吐清沫而清沫中雜米穀一粒而出自此病勢大減因進米飲聯服數碗其翌日因爲粥食此病在窮村故未暇溫胃和解之藥其後又有少陰人一人日下利數次而仍下清水全腹浮腫初用桂附薑陳理中湯倍加人蔘官桂各二錢附子二錢

或一錢日四服數日後則日三服至十餘日遂下利清穀連三日三四十行而浮腫大減又少陰人小兒一人下利青水面色青黯氣陷如睡用獨參湯加生薑二錢陳皮砂仁各一錢日三四服數日後下利十餘行大汗解蓋少陰人癨亂關格病得人中汗者始免危也食滯大下者次免危也自然能吐者快免危也禁進粥食但進好熟冷或米飲者扶正抑邪之良方也宿滯之彌留者得好熟冷乘熱溫進則消化無異於飲食雖絕食二三四日不必爲慮

○張仲景曰少陰病脈微細但欲寐

○傷寒欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰小便色白宜四逆湯

○少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沈者附子湯主之

○下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻

表宜桂枝湯

○論曰右證當用官桂附子理中湯

○張仲景曰少陰病始得之反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯主之

○少陰病一二日口中和背惡寒宜附子湯

○少陰病二三日用麻黃附子甘草湯微發之以二三日無證故微發汗也無證謂無吐利厥證也

○下利脈沈而遲其人面小赤身有微汗下利清穀必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

○少陰病脈細沈數病爲在裏不可發汗少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出是爲下厥上竭難治

○論曰張仲景所論太陰病少陰病俱是少陰人胃氣虛弱泄瀉

之證而太陰病泄瀉重證中平證也少陰病泄瀉危證中險證也人但見泄瀉同是一證而易於尋常做圖則必不免死蓋太陰病泄瀉大腸之泄瀉也少陰病泄瀉胃中之泄瀉也太陰病泄瀉溫氣逐冷氣之泄瀉也少陰病泄瀉冷氣逼溫氣之泄瀉也

○少陰病欲自愈則面小赤身有微汗必鬱冒汗出而解故古人有見於此少陰病但厥無汗者亦以麻黃強發汗欲其自愈而反動其血從口鼻出故於是乎始爲戒懼凡少陰病不敢輕易用麻黃而少陰病始得之一二日二三日初證以麻黃附子甘草湯微發之也然麻黃爲少陰病害藥則雖二三日初證必不可用麻黃發之也此證當用官桂附子理中湯或以桂枝易官桂

○少陰病初證因爲險證繼而爲危證此病初證早不辨證而措

置則危境也凡腹痛自利無口渴口中和者爲太陰病腹痛自利而有口渴口中不和者爲少陰病少陰病有身體痛骨節痛表證此則表裏俱病而大腸寒氣必勝胃中溫氣而上升也太陰病無身體痛骨節痛表證此則裏病表不病而胃中溫氣猶勝大腸寒氣而下降也

○張仲景曰少陰病自利純青水心下痛口燥乾者宜大承氣湯

○朱肱曰少陰病口燥咽乾而渴宜急下之非若陽明宜下而可緩也

○李杲東垣書曰少陰證口中辨口中和者當溫口中乾燥者當下少陰證下利辨色不青者當溫色青者當下

○李梴曰舌乾口燥或下利清水譫語便閉宜小承氣湯唇青四肢厥冷指甲青黑宜薑附湯

○論曰下利青水者欲下之則當用巴豆欲溫之則當用官桂附子理中湯下利清水仍爲便開者先用巴豆後用薑朮寬中湯

○嘗見少陰人十歲兒思慮耗氣每有憂愁一二日則必腹痛泄瀉一二日用白何烏理中湯二三四貼或甚則附子理中湯一二貼則泄瀉必愈矣忽一日此兒心有憂愁氣度不平數日故預治次用白何烏理中湯二貼則泄瀉因作下利青水連用六貼青水不止急用附子理中湯六貼青水變爲黑水又二貼黑水泄瀉亦愈又二三貼調理以此觀之則下利青水者病人有癨亂關格而後成此證也此證當用巴豆破積滯痼冷自是無疑此兒十歲冬十二月有下利青水病十一歲春二月又得陰陽病

○朱肱曰躁無暫定而厥者爲藏厥

○李梴曰藏厥者發躁無休息時發熱七八日脈微膚冷而躁或

吐或瀉無時暫安者乃厥陰眞藏氣絶故曰藏厥仲景無治法而四逆湯冷飲救之又少陰病厥而吐利發躁者亦不治而三味參萸湯救之

○論曰少陰人喜好不定而計窮力屈則心煩躁也少陰病傷寒欲吐不吐心煩但欲寐者此非計窮力屈者之病乎蓋喜好者所慾也何故至於計窮力屈而得此少陰病乎何不早用君子寬平心乎然初證傷寒欲吐不吐心煩但欲寐者早用藥則猶可免死也其病至於躁無暫定而厥則勢在極危也宜不可憐乎此證當用參萸湯四逆湯官桂附子理中湯吳茱萸附子理中湯

○朱肱曰病人身冷脈沈細而疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也若飲水者非此證也厥陰病渴欲飲水者小小與之愈

○成無己曰煩謂心中鬱煩也躁謂氣外熱躁也但煩不躁及先

煩後躁者皆可治但躁不煩及先躁後煩者皆不可治先躁後煩謂怫怫然熱作躁悶此陰盛隔陽也雖大躁欲於泥水中臥但水不得入口是也此氣欲絕而爭譬如燈將滅而暴明

○李梴曰傷寒陰盛隔陽其證身冷反躁欲投井中唇青面黑渴欲飲水復吐大便自利黑水六脈沈細而疾或無脈陰盛隔陽大虛證也宜霹靂散又曰厥逆煩躁者不治

○論曰此證當用官桂附子理中湯吳茱萸附子理中湯或用霹靂散

○藏厥與陰盛隔陽病情大同小異俱在極危如存一髮措手難及若論此病之可治上策莫如此證未成之前早用官桂附子理中湯吳茱萸附子理中湯

○凡觀少陰人病泄瀉初證者當觀於心煩與不煩也心煩則口

渴而口中不和也心不煩則口不渴而口中和也觀少陰人病危證者當觀於躁之有定無定也欲觀躁之有定無定則必占心之範圍有定無定也心之範圍綽綽者心之有定而躁之有定也心之範圍耿耿者心之無定而躁之無定也心雖耿耿忽忽猶有一半時刻綽綽卓卓則其病可治可治者用薑附而可效也

○凡少陰人泄瀉日三度重於一二度也四五度重於二三度也而日四度泄瀉則太重也泄瀉一日輕於二日也二日輕於三四日也而連三日泄瀉則太重也少陰人平人一月間或泄瀉二三次則不可謂輕病人也一日間乾便三四度則不可謂輕病人也下利清穀者雖日數十行口中必不燥乾而冷氣外解也下利清水者腹中必有青水也若下利黃水則非清水而又必雜穢物也

○張仲景曰傷寒七八日身黃如梔子色小便不利腹微滿屬太

陰宜茵蔯蒿湯傷寒但頭汗出餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃

○李梴曰天行疫癘亦能發黃謂之瘟黃殺人最急宜瘴疸丸

○論曰右證當用茵蔯橘皮湯茵蔯附子湯茵蔯四逆湯瘴疸丸或用巴豆丹

○醫學綱目曰但結胸無大熱者此爲水結但頭汗出名曰水結胸小半夏湯主之

○龔信曰寒實結胸無熱證者宜三物白散

○論曰右證當用桂枝半夏生薑湯赤白何烏寬中湯三物白散或用巴豆丹

○少陽人病心下結硬者名曰結胸病其病可治也少陰人病心下結硬者名曰藏結病其病不治也醫學綱目醫鑑所論水結胸

寒實結胷證藥俱是少陰人太陰病而與張仲景茵蔯蒿湯證相類則此病想必非眞結硬於心下而卽痞滿於心下者也張仲景瀉心湯證傷寒下利心下痞硬汗解後心下痞硬云者亦皆痞滿於心下或臍上近處結硬也而非眞結硬於心下者也若少陰人病而心下右邊結硬則不治

○張仲景曰病有結胷有藏結其狀如何曰按之痛寸脈浮關脈沈名曰結胷也何謂藏結曰如結胷狀飮食如故時時下利寸脈浮關脈細小沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難治病人胷中素有痞連在臍傍引入小腹入陰筋者此名藏結死

○朱肱曰藏結狀如結胷飮食如故時時下利而舌上白胎歌曰飮食如常時下利更加舌上白胎時連臍腹痛引陰筋此疾元來死不醫

○論曰嘗見少陰人一人心下右邊結硬百藥無效與巴豆如意丹反劇搖頭動風有頃而止數月後死其後又有少陰人一人有此證者用巴豆丹面上身上有汗而獨上唇人中穴左右邊無汗此人一周年後亦死凡少陰人心下結硬有此證者目睛四五人或半年或一年針灸醫藥無不周至而個個無回生之望此即藏結病而少陰人病也

○張仲景曰黃疸之病當以十八日爲期十日以上宜差反劇爲難治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱

○諸疸小便黃赤色者爲濕熱當作濕熱治小便色白不可除熱者無熱也若有虛寒證當作虛勞治

○腹脹滿面萎黃躁不得睡

○黃家日晡時當發熱反惡寒此爲女勞得之腹胱急小腹滿一

身盡黃額上黑足下熱因作黑疸腹脹如水狀大便黑或時溏此女勞之病非水也腹滿者難治

○朱肱曰陰黃煩躁喘嘔不渴宜用茵蔯橘皮湯一人傷寒發黃脈微弱身冷次第用藥至茵蔯四逆湯大效一人傷寒發黃脈沈細遲無力次第用藥至茵蔯附子湯大效

○醫學綱目曰濕家之黃色暗不明一身不痛熱家之黃如橘子一身盡痛

○王好古曰凡病當汗而不汗當利小便而不利亦生黃

○朱震亨曰黃疸因食積者下其食積其餘但利小便小便利白其黃自退

○李梴曰黃疸十日以上入腹喘滿煩渴面黑者死

○王叔和脈經曰黃家寸口脈近掌無脈口鼻冷黑色並不可治

○論曰陰黃卽少陰人病也當用朱氏茵蔯橘皮湯茵蔯四逆湯女勞之黃熱家之黃利小便之黃想或非少陰人病而余所經驗未嘗一遇黃疸而治之故未得仔細裏許然痞滿黃疸浮腫同出一證而有輕重若欲利小便則乾薑良薑陳皮青皮香附子益智仁能利少陰人小便荊芥防風羌活獨活茯苓澤瀉能利少陽人小便

泛論

論曰發熱惡寒者爲太陽病發熱不惡寒者爲陽明病太陽陽明之發熱形證一也而惡寒不惡寒之間相去遠甚而陽氣之進退強弱泰山之比岡陵也自利而不渴者爲太陰病自利而渴者爲少陰病太陰少陰之自利形證一也而渴不渴之間相去遠甚而冷氣之聚散輕重雲夢之比瀦澤也是故藿香正氣散香砂養胃

湯之證勢平地駿馬之病勢也獨蔘八物湯桂附理中湯之證勢太行短笻之病勢也若使一天下少陰人稟賦者自知其病之陽明少陰證如太行之險路得之可畏救之不易攝身療病戒懼謹愼之道有若大路然而不迷則其庶幾乎

○太陽病汗出熱氣卻寒氣之汗出也陽明病汗出寒氣犯熱氣之汗出也太陰病下利溫氣逐冷氣之下利也少陰病下利冷氣逼溫氣之下利也

○少陰人病有二吉證人中汗一吉證也能飲水一吉證也

○少陰人病有二急證發熱汗多一急證也下利清水一急證也

○少陰人病有六大證一曰少陰病二曰陽明病三曰太陰病毒證也四曰太陽病厥陰證也五曰太陰病黃疸證也六曰太陽病胃家實證也

○發熱汗出則病必解也而發熱汗出而病益甚者陽明病也通滯下利則病必解也而通滯下利而病益甚者少陰病也陽明少陰以邪犯正之病不可不急用藥也惡寒汗出則病必盡解也而惡寒汗出而其病半解半不解者厥陰之漸也腹痛下利則病必盡解也而腹痛下利而其病半解半不解者陰毒之漸也厥陰陰毒正邪相傾之病不可不預用藥也發熱一汗而病即解者太陽之輕病也食滯一下而病即解者太陰之輕病也太陽太陰之輕病不用藥而亦自愈也發熱三日不得汗解者太陽之尤病也食滯三日不能化下者太陰之尤病也太陽太陰之尤病已不可謂輕證而用藥二三貼亦自愈也發熱六日不得汗解食滯六日不能化下者太陽太陰之胃家實黃疸病也太陽太陰之胃家實黃疸正邪壅錮之病不可不大用藥也

○太陽太陰之病六七日或成危證或成重證而十日內必有險證陽明少陰之病自始發已爲重證而二三日內亦致險證是故陽明少陰之病不可不察於始發也太陽太陰之病不可不察於四五日間也

○太陽太陰之病病勢緩而能曠日持久故變證多也陽明少陰之病病勢急而不能曠日持久故變證少也蓋陽明少陰病過一日而至二日則不可不用藥也太陽太陰病過四日而至五日則不可不用藥也太陽太陰之厥陰陰毒皆六七日之死境也尤不可不謹也

○陽明太陽之危者獨參八物湯補中益氣湯可以解之而病勢危時若非日三四服而又連日服則難解也少陰太陰之危者獨參附子理中湯桂附藿陳理中湯可以解之而病勢危時若非日

三四服而又連日服則難解也病勢極危時日四服病勢半危時日三服病勢不減則日二服病勢少減則二日三服而一日則一服一日則二服病勢大減則日一服病勢又大減則間二三四五日一服蓋有病者可以服藥無病者不可以服藥重病可以重藥輕病不可以重藥若輕病好用重藥無病者好服藥臟氣脆弱益招病矣

○膏粱雖則助味常食則損味羊裘雖則禦寒常着則攝寒膏粱羊裘猶不可以常食常着況藥乎若論常服藥之有害則反爲百倍於全不服藥之無利也蓋有病者明知其證則必不可不服藥無病者雖明知其證必不可服藥歷觀於世之服鴉片煙水銀山參鹿茸者屢服則無不促壽者以此占之則可知矣

○少陰人吐血當用獨參八物湯咽喉痛當用獨參官桂理中湯

○嘗見少陰人飲食倍常口味甚甘不過一月其人浮腫而死少陰人食消即浮腫之屬而危證也不可不急治當用芎歸葱蘇理中湯

○嘗見少陰人浮腫獐肝一部切片作膾一服盡連用五部其病即效又有少陰人服獐肝一部眼力倍常眞氣湧出少陽人虛勞病服獐肝一部其人吐血而死

○嘗見少陰人浮腫有醫教以服海塩自然汁日半匙四五日服浮腫大減一月服永爲完健病不再發

○嘗見少陰人咽喉痛經年不愈有醫教以服金蛇酒即效金蛇酒即金色黃章蛇釀酒者也

○嘗見少陰人痢疾有醫教以服項赤蛇煎湯即效項赤蛇去頭斷尾納二曇紬囊中藥缸內別設橫木懸空掛之用水五碗煎取

一碗服二疊紬囊懸空掛煎者恐犯蛇骨故也蛇骨有毒
○嘗見少陰人痢疾有醫教以大蒜三顆清蜜半匙同煎三日服
即效
○嘗見少陰人乳傍近脅有漏瘡歷七八月瘡口不合惡汁常流
有醫教以山參熊膽末各一分傳之即效又少陰人一人滿身有
瘡以人蔘末塗傳即效
○嘗見少陰人乳傍近脅發內癰有醫教以火針取膿醫曰內癰
外證惡寒發熱似傷寒而有痛處也察其痛處明知有膿則不可
不用火針
○嘗見少陰人背癰有醫教以火刀裂瘡醫曰火刀裂瘡宜早也
若疑訝而緩不及事則全背堅硬悔之無及
○嘗見少陰人半身不遂病有醫教以服鐵液水得效

○嘗見少陰人小兒腹瘧病有醫教以瘧病將發之早朝用火煆金頂砒極細末六厘生甘草湯調下卽效醫曰砒藥必金頂砒然後可用而又火煆然後可用也必不可過六厘而又不可不及六厘也過六厘則藥毒太過也不及六厘則瘧不愈也此藥屢試屢驗而有一服愈後瘧又再發者又用之則其病益甚而危蓋此藥可以一服不可再服云聽醫言而究其理則一服愈而瘧不再發者皆少陰人兒也一服愈而瘧又再發者皆非少陰人兒也惟少陰人兒腹瘧病難治者用此藥尋常瘧不必用此不祥之藥少陰人尋常間日瘧惡寒時用川芎桂枝湯二三貼則亦無不愈又腹中實滿而大便硬瘧發者亦可用巴豆

○百藥莫非善藥而惟少陰人信砒藥太陰人瓜蔕藥最爲惡藥也何哉少陰人信砒藥百病用之皆殆而秖有治瘧之一能者亦

有名無實不無危慮萬不如桂枝人參白芍藥三四服之治瘧則此非天下萬害無用之藥乎太陰人瓜蒂藥百病用之皆殆而祇有治痰涎壅塞之一能者亦有名無實不無危慮萬不如桔梗麥門冬五味子三四服之治痰涎壅塞則此非天下萬害無用之藥乎此二藥外治可用內服不可用

○嘗見少陰人中氣病舌卷不語有醫針合谷穴而其效如神其他諸病之藥不能速效者針能速效者有之蓋針穴亦有太少陰陽四象人應用之穴而必有升降緩速之妙緊是不可不察敬俟後之謹厚而好活人者

張仲景傷寒論中少陰人病經驗設方藥二十三方

桂枝湯

桂枝三錢白芍藥二錢甘草一錢薑三片棗二枚

理中湯

人參、白朮、乾薑各二錢 甘草炙一錢

薑附湯

乾薑一兩 附子並炮一枚剉。取五錢 水煎服、附子生用、名曰白通湯

四順理中湯

人參、白朮、乾薑、甘草炙各二錢

人參桂枝湯

甘草炙桂枝各一錢八分 白朮、人參、乾薑各一錢五分

四逆湯

甘草炙六錢 乾薑炮五錢 生附子一枚剉分二貼、水煎服

厚朴半夏湯

厚朴三錢 人參半夏各一錢五分 甘草七分五厘 薑七片

半夏散

半夏製 甘草炙 桂枝各二錢

赤石脂禹餘粮湯

赤石脂禹餘粮各二錢五分

附子湯

白朮四錢 白芍藥 白茯苓各三錢 附子炮 人參各二錢

麻黃細辛附子湯

麻黃細辛各二錢 附子炮 一錢

麻黃附子甘草湯

麻黃甘草各三錢 附子炮 一錢

當歸四逆湯

白芍藥、當歸各二錢 桂枝一錢五分 細辛、通草、甘草各一錢

半夏瀉心湯

半夏製二錢 人蔘、甘草、黃芩各一錢五分 乾薑一錢 黃連五分 薑三片 棗二枚

生薑瀉心湯

生薑、半夏各二錢 人蔘、乾薑各一錢五分 黃連、甘草各一錢 黃芩五分 棗三枚

甘草瀉心湯

甘草二錢 乾薑、黃芩各一錢五分 半夏製 人蔘各一錢 棗三枚

茵蔯蒿湯

茵蔯一兩 大黃五錢 梔子二錢 先煎茵蔯、減二約二味煎、又減半服日二、小便當利、色正赤、腹漸減、黃從小便去也

抵當湯

水蛭、蝱虫並炒去足翅桃仁留尖各十枚大黃蒸三錢

桃仁承氣湯

大黃三錢桂心芒硝各二錢甘草一錢桃仁留尖十枚

麻仁丸

大黃蒸四兩枳實厚朴赤芍藥各二兩麻子仁一兩五錢杏仁一兩二錢五分爲末蜜丸梧子大空心溫湯下五十丸

蜜導法

老人虛人不可用藥者用蜜熬入皂角末少許稔作錠子納肛門即通

大承氣湯

大黃四錢厚朴枳實芒硝各二錢水二大盞先煎枳朴至一盞乃

下大黃煎至七分去滓入芒硝再一沸溫服

小承氣湯

大黃四錢厚朴枳實各一錢五分剉作一貼水煎服

宋元明三代醫家著述中少陰人病經驗行用要藥十三方已互藥六方

十全大補湯

人參白朮白芍藥甘草炙黃芪肉桂當歸川芎白茯苓熟地黃各一錢薑三片棗二枚○此方出於王好古海藏書中治虛勞○今考更定此方當去白茯苓熟地黃當用砂仁陳皮

補中益氣湯

黃芪一錢五分甘草炙人參白朮各一錢當歸陳皮各七分升麻柴胡各三分薑三片棗二枚○此方出於李杲東垣書中治勞倦

虛弱身熱而煩自汗倦怠○今考更定此方黃芪當用三錢而當去升麻柴胡當用藿香紫蘇葉

香砂六君子湯

香附子白朮白茯苓半夏陳皮厚朴白豆蔻各一錢人參甘草木香縮砂益智仁各五分薑三片棗二枚○此方出於龔信醫鑑書中治不思飲食食不下食後倒飽○今考更定此方當去白茯苓當用白何首烏

木香順氣散

烏藥香附子青皮陳皮厚朴枳殼半夏各一錢木香縮砂各五分桂皮乾薑甘草炙各三分薑三片棗二枚○此方出於龔信萬病回春書中治中氣病中氣者與人相爭暴怒氣逆而暈倒也先以薑湯救之甦後用此藥

蘇合香元

白朮、木香、沈香、麝香、丁香、安息香、白檀香、訶子皮、香附子、藿撥、犀角、朱砂各二兩 朱砂半爲衣蘇合油入安息香膏內、乳香、龍腦各一兩 右細末、用安息香膏並煉蜜搜和千搗、每一兩、分作四十丸、每取二三丸、井華水或溫水下○此方、出於局方、治一切氣疾中氣上氣氣逆氣鬱氣痛○許叔微本事方、曰凡人暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁怫意氣多厥逆、當用此藥、若槩作中風治、多致殺人○危亦林得效方曰中風、脈浮身溫、口多痰涎、中氣、脈沈身涼、口無痰涎○今考更定、此方、當去麝香、犀角、朱砂、龍腦、乳香、當用藿香、茴香、桂皮、五靈脂、玄胡索

藿香正氣散

藿香一錢五分 紫蘇葉一錢 厚朴、大腹皮、白朮、陳皮、半夏、甘草、桔

梗、白芷、白茯苓各五分薑三片棗二枚○此方、出於龔信醫鑑書中、治傷寒○今考更定、此方、當去桔梗、白芷、白茯苓、當用桂皮、乾薑、益智仁

香蘇散

香附子三錢紫蘇葉二錢五分陳皮一錢五分蒼朮、甘草各一錢薑三片葱白二莖○此方、出於危亦林得效方書中、治四時瘟疫○局方曰昔有一老人授此方、與一人令其合施、城中大疫、服此皆愈

桂枝附子湯

附子炮桂枝各三錢白芍藥二錢甘草炙一錢薑三片棗二枚○此方、出於李梴醫學入門書中、治汗漏不止、四肢拘急、難以屈伸

茵蔯四逆湯

茵蔯一兩 附子、乾薑並炮 甘草炙 各一錢 ○治陰黃病、冷汗不止

茵蔯附子湯

茵蔯一兩 附子炮 甘草炙 各一錢 ○治陰黃病、身冷

茵蔯橘皮湯

茵蔯一兩 陳皮、白朮、半夏、生薑 各一錢 ○治陰黃病、喘嘔不渴、右三方、出於朱肱活人書中

三味參萸湯

吳茱萸三錢 人蔘二錢 薑四片 棗二枚 ○治厥陰證、嘔吐涎沫、少陰證厥冷煩躁、陽明證、食穀欲嘔、皆妙

霹靂散

附子一枚 炮過、以冷灰培半時取出、切半枚細剉入臘茶一錢 水一盞煎至六分、去渣入熟蜜半匙 放冷服之、須臾躁止、得睡汗出

差○治陰盛隔陽證、右二方、出於李梴醫學入門書中

溫白元

川烏炮 二兩五錢 吳茱萸、桔梗、柴胡、石菖蒲、紫菀、黃連、乾薑炮肉桂、川椒炒赤、茯苓、皂角炙 厚朴、人參、巴豆霜 各五錢 右爲末、煉蜜和丸梧子大、薑湯下三丸或五丸至七丸○此方出於局方、治積聚癥癖、黃疸鼓脹十種水氣九種心痛八種痞塞五種痲疾遠年瘧疾○龔信醫鑑曰婦人腹中積聚有似懷孕、羸瘦困弊或歌哭如邪祟、服此藥自愈、久病服之則皆瀉出蟲蛇惡膿之物

瘴瘧丸

茵蔯、梔子、大黃、芒硝 各一兩 杏仁六錢 常山鱉甲、巴豆霜 各四錢 豆豉二錢 右爲末、蒸餅和丸梧子大、每三丸或五丸、溫水送下○此方、出於危亦林得效方書中、一名茵蔯丸、治時行瘟疫及瘴瘧

黃疸濕熱病

三稜消積丸

三稜、蓬朮、神麴各七錢 巴豆、和皮入米同炒黑去米、青皮、陳皮、莪香各五錢 丁香皮、益智仁各三錢 右爲末、醋糊和丸梧子大、薑湯下三四十丸○此方、出於李杲東垣書中、治生冷物不消滿悶

秘方化滯丸

三稜、蓬朮並煨各四錢八分 半夏麴 木香、丁香、青皮陳皮並去白 黃連各二錢五分 巴豆、肉醋浸一宿熬乾六錢 右爲末、以烏梅末入麵少許煮作糊和丸黍米大、每服五七丸至十丸、欲通利則以熱湯下、欲磨積則陳皮湯下、欲止泄則飲冷水○此方、出於朱震亨丹溪心法書中、理一切氣、化一切積、久堅沈痼、磨之自消、暴積作閉、導之立去、奪造化、有通塞之功、調陰陽、有補瀉之妙

三物白散

桔梗、貝母、各三錢　巴豆、去皮心熬研如脂一錢　右爲末、和勻白湯、和服半錢、弱人減半、或吐或利不利、進熱粥一碗、利不止、進冷粥一碗

如意丹

川烏炮八錢　檳榔、人參、柴胡、吳茱萸、川椒、白茯苓、白薑、黃連、紫菀、厚朴、肉桂、當歸、桔梗、皂角、石菖蒲各五錢　巴豆霜二錢五分　右爲末、煉蜜和丸梧子大、朱砂爲衣、每五丸或七丸、溫水下○專治瘟疫及一切鬼祟、右二方、出於李梴醫學入門書中

○論曰右巴豆六方、卽古人之各自置方、各自經驗而此六方、同是一巴豆之力則所用、亦無異而同歸於一也、蓋巴豆少陰人病之必不可不用而又不可輕用、必不可浪用而又不可疑用之藥

故聯錄六方備述經驗昭明其理者欲其用之必中而不敢輕忽也

新定少陰人病應用要藥二十四方

黃芪桂枝附子湯

桂枝、黃芪各三錢 白芍藥二錢 當歸、甘草炙各一錢 附子炮一錢 或二錢 薑三片 棗二枚

人蔘桂枝附子湯

人蔘四錢 桂枝三錢 白芍藥、黃芪各二錢 當歸、甘草炙各一錢 附子炮一錢 或二錢 薑三片 棗二枚

升陽益氣附子湯

人蔘、桂枝、白芍藥、黃芪各二錢 白何首烏、官桂、當歸、甘草炙各一錢 附子炮一錢 或二錢 薑三片 棗二枚

人參官桂附子湯

人參五錢或一兩　官桂、黃芪各三錢　白芍藥二錢　當歸、甘草炙各一錢　附子炮二錢或二錢五分　薑三片　棗二枚

右四方、皆亾陽危病藥也、亾陽病人、小便白而多、危有餘地則用附子一錢日再服、小便赤而少、危無餘地則用附子二錢日二三服、病在將危、用一錢、病在免危、用一錢、病在調理、亦一錢日再服

升陽益氣湯

人參、桂枝、黃芪、白芍藥各二錢　白何首烏、官桂、當歸、甘草炙各一錢　薑三片　棗二枚

補中益氣湯

人參、黃芪各三錢　甘草炙　白朮、當歸、陳皮各一錢　藿香、蘇葉各三

分或各五分 薑三片 棗二枚

黃芪桂枝湯

桂枝三錢 白芍藥黃芪各二錢 白何首烏當歸甘草炙各一錢 薑三片 棗二枚

川芎桂枝湯

桂枝三錢 白芍藥二錢 川芎蒼朮陳皮甘草炙各一錢 薑三片 棗二枚

芎歸香蘇散

香附子二錢 紫蘇葉川芎當歸蒼朮陳皮甘草炙各一錢 薑三片 棗二枚

藿香正氣散

藿香一錢五分 紫蘇葉一錢 蒼朮白朮半夏陳皮青皮大腹皮桂

皮、乾薑、益智仁、甘草炙各五分 薑三片 棗二枚

八物君子湯

人參二錢 黃芪、白朮、白芍藥、當歸、川芎、陳皮、甘草炙各一錢 薑三片 棗二枚

本方、以白何首烏、易人參則名曰白何烏君子湯、本方、用參芪各一錢、加白何首烏、官桂各一錢則名曰十全大補湯、本方、用人參一兩黃芪一錢則名曰獨參八物湯

香附子八物湯

香附子、當歸、白芍藥各二錢 白朮、白何首烏、川芎、陳皮、甘草炙各一錢 薑三片 棗二枚

嘗治婦人、思慮傷脾、咽乾舌燥、隱隱有頭痛、神效

桂枝半夏生薑湯

生薑三錢 桂枝、半夏各二錢 白芍藥、白朮、陳皮、甘草炙各一錢

治虛寒嘔吐水結胷等證

香砂養胃湯

人參、白朮、白芍藥、甘草炙、半夏、香附子、陳皮、乾薑、山查肉、砂仁、白豆蔻各一錢 薑三片 棗二枚

赤白何烏寬中湯

白何首烏、赤何首烏、良薑、乾薑、青皮、陳皮、香附子、益智仁各一錢 棗二枚

治四體倦怠、小便不快、陽道不興、將有浮腫之漸者、用之、本方、加厚朴、枳實、木香、大腹皮各五分則又有通氣脈之功力、雖浮腫已成者、安心靜慮一百日而日再服則自無不效之理、本方、以人參、易赤何首烏則名曰人參白何烏寬中湯、以當歸、易赤

何首烏則名曰當歸白何烏寬中湯古方有乾薑良薑青皮陳皮等分作湯丸名曰寬中湯嘗治少陰人小便不快陽道不興四體倦怠無力者用之必效百發百中又寬中丸本方加五靈脂益智仁各一錢則治腹痛神效

蒜蜜湯

白何首烏白朮白芍藥桂枝茵蔯益母草赤石脂鶯粟殼各一錢薑三片棗二枚大蒜五根清蜜半匙

治痢疾

鷄蔘膏

人蔘一兩桂皮一錢鷄一首濃煎服或以胡椒清蜜助滋味無妨此方自古有方治瘧疾痢疾神效嘗治久瘧先用巳豆通利大便後數三日連用鷄蔘膏快效桂皮或以桂心代用

巴豆丹

巴豆一粒去殼取粒溫水吞下全粒或半粒仍煎湯藥以煎藥時刻巴豆獨行腹胃間太半用力然後服湯藥則湯藥可以與巴豆同行通快腹胃升提其氣也再煎湯藥大便通後又連服之巴豆全粒下利半粒化積

人蔘陳皮湯

人蔘一兩生薑砂仁陳皮各一錢棗二枚

本方以炮乾薑易生薑又加桂皮一錢則尤有溫胃逐冷之力以本方嘗治末周年小兒陰毒慢風連服數日病快愈矣病愈後更不服藥再發不治

人蔘吳茱萸湯

人蔘一兩吳茱萸生薑各三錢白芍藥當歸官桂各一錢

官桂附子理中湯

人蔘三錢 白朮、乾薑炮 官桂各二錢 白芍藥、陳皮、甘草炙各一錢 附子炮一錢或二錢

吳茱萸附子理中湯

人蔘、白朮、乾薑炮 官桂各二錢 白芍藥、陳皮、甘草炙 吳茱萸、小茴香、破故紙各一錢 附子炮一錢或二錢

白何烏附子理中湯

白何烏、白朮炒 白芍藥微炒 桂枝、乾薑炮各二錢 陳皮、甘草炙 附子炮各一錢

白何烏理中湯

白何烏、白朮、白芍藥、桂枝、乾薑炮各二錢 陳皮、甘草炙各一錢

有人蔘則用人蔘、無人蔘則用白何首烏、白何首烏、與人蔘性

味相近而清越之力不及溫補之力過之不無異同之處險病危證人蔘二錢以上不可全恃白何首烏代用古方經驗不多藥材生疎故也然此一味必不可遺棄於補藥中而古方何人飲用白何首烏五錢治瘧病

右少陰人藥諸種附子炮用甘草灸用乾薑炮用或生用黃芪灸用或生用

○窮巷僻村病起倉卒雖單方猶百勝於束手無策陽明病雖單黃芪桂皮人蔘芍藥亦可用少陰病雖單附子芍藥人蔘甘草亦可用太陽病雖單蘇葉葱白黃芪桂枝亦可用太陰病雖單白朮乾薑陳皮藿香亦可用爲先用單方而一邊求得全方則必無救病失機之理然當用全方中所有之藥不當用全方中所無之藥

東醫壽世保元卷之三

少陽人脾受寒表寒病論

張仲景曰太陽病脈浮緊發熱惡寒身痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之

○論曰發熱惡寒脈浮緊身痛不汗出而煩躁者卽少陽人脾受寒表寒病也此證不當用大青龍湯當用荊防敗毒散

○張仲景曰少陽之爲病口苦咽乾目眩

○眩而口苦舌乾者屬少陽

○口苦耳聾胷滿者少陽傷風證也

○口苦咽乾目眩耳聾胷脅滿或往來寒熱而嘔屬少陽忌吐下宜小柴胡湯和之

○論曰此證不當用小柴胡湯當用荊防敗毒散荊防導赤散荊

防瀉白散

○張仲景所論少陽病口苦咽乾胷脅滿或往來寒熱之證卽少陽人腎局陰氣爲熱邪所陷而脾局陰氣爲熱邪所壅不能下降連接於腎局而凝聚脅間膠固囚滯之病也此證嘔者外寒包裡熱而挾疾上逆也寒熱往來者脾局陰氣欲降未降而或降故寒熱或往或來也口苦咽乾目眩耳聾者陰氣囚滯脅間欲降未降故但寒無熱而至於耳聾也口苦咽乾目眩者例證也耳聾者重證也胷脅滿者結胷之漸也脅滿者猶輕也胷滿者重證也古人之於此證用汗吐下三法則其病輒生譫語壞證病益危險故仲景變通之而用小柴胡湯清痰燥痰溫冷相雜平均和解欲其病不轉變而自愈此法以汗吐下三法論之則可謂近善而巧矣然此小柴胡湯亦非平均和解病不轉變之藥則從古斯今得此病

者是寒心矣耳聾胃滿傷風之病豈可以小柴胡湯擬之乎噫後來襲信所製荊防敗毒散豈非少陽人表寒病三神山不宛藥乎此證清裏熱而降表陰則痰飲自散而結胃之證預防不成也清痰而燥痰則無益於陰降痰散延拖結胃將成而或別生奇證也

○朱肱曰凡發汗腰以上雖淋漓而腰以下至足微潤則病終不解

○論曰少陽人病無論表裏病手足掌心有汗則病解手足掌心不汗則雖全體皆汗而病不解

○少陽人傷寒病有再痛三痛發汗而愈者此病非再三感風寒而再痛發汗三痛發汗也少陽人頭痛腦強寒熱往來耳聾胃滿尤甚之病元來如此表邪深結至於三痛然後方解也無論初痛

再痛三痛用荊防敗毒散或荊防導赤散荊防瀉白散每日二貼式至病解而用之病解後又用十餘貼如此則自無後病而完健

○張仲景曰少陽證濈濈汗出心下痞硬滿引脅下痛乾嘔短氣不惡寒表解裏未和也宜十棗湯若合下不下令人脹滿遍身浮腫

○傷寒表未解醫反下之膈內拒痛手不可近心下滿而硬痛此爲結胸宜大陷胸湯

○渴欲飲水水入卽吐名曰水逆五苓散主之

○杜壬曰裏未和者蓋痰與燥氣壅於中焦故頭痛乾嘔汗出痰隔也非十棗湯不治

○龔信曰心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實脈沈實有力爲大結胸大陷胸湯下之反加煩躁者死小結胸正在心下按之則

痛宜小陷胸湯

○論曰右張仲景所論三證皆結胸病而膈內拒痛手不可近燥渴譫語者結胸之最尤甚證也飲水水入即吐心下痞硬滿乾嘔短氣者次證也凡結胸病皆藥湯入口輒還吐惟甘遂末入口誕含下因以溫水漱口而下則藥不還吐嘗治結胸用甘遂散溫水調下五次輒還吐至六次不還吐而下利一度其翌日又水還吐又用甘遂一次快通利而病愈凡結胸無非險證當先用甘遂仍煎荊防導赤散以壓之乾嘔短氣而藥不還吐者不用甘遂但用荊防導赤散加茯苓澤瀉各一錢二三服又連日服而亦病愈燥渴譫語者尤極險證也急用甘遂仍煎地黃白虎湯三四貼以壓之又連日服地黃白虎湯張仲景曰傷寒表未解醫反下之云者以大承氣湯下之之謂也非十棗陷胸下之之謂也然十棗陷

胃、不如單用甘遂五或用甘遂天一丸結胃「甘遂末」例用三分五大結胃「用五分」裹信所論燥渴譫語煩躁死者分若十棗湯下後「因以譫語證」治之連用白虎湯則煩躁者「必無不治之理」

○甘遂「表寒病」破水結之藥也五石膏「裡熱病」通大便之藥也「表病」可用甘遂而不可用石膏「裡病」可用石膏而不可用甘遂「然」揚手擲足引飲泄瀉證「用石膏」痺風膝寒大便不通證「用甘遂」

○少陰人傷寒病「有小腹硬滿之證」少陽人傷寒病「有心下結胃之證」此二證俱是表氣陰陽虛弱正邪相爭累日不洩之中「裡氣亦秘澁不和而變生此證也」

○李子建傷寒十勸論「曰傷寒腹痛亦有熱證不可輕服溫煖藥」又曰傷寒自利當觀陰陽證不可例服溫煖及止瀉藥

○朱震亨「曰傷寒陽證」身熱脈數煩渴引飲大便自利宜柴苓湯

○盤龍山老人論曰少陽人身熱頭痛泄瀉當用猪苓車前子湯荊防瀉白散身寒腹痛泄瀉當用滑石苦參湯荊防地黃湯此病名謂之亾陰病

○少陽人身熱頭痛泄瀉一二日或三四日而泄瀉無故自止身熱頭痛不愈大便反秘者此危證也距譫語不遠

○泄瀉後大便一晝夜間艱辛一次滑利或三四五次小小滑利而身熱頭痛因存者此便秘之兆也譫語前有此證則譫語當在數日譫語後有此證則動風必在咫尺

○少陽人忽然有吐者必生奇證也當用荊防敗毒散以觀動靜無疑

○嘗見少陽人兒生未一周年忽先一吐而後泄瀉身熱頭痛揚

手擲足轉輾其身引飲泄瀉四五六次無度數者用荊防瀉白散日三貼兩日六貼然後泄瀉方止身熱頭痛清淨又五六貼而安

○少陽人身熱頭痛揚手擲足引飲者此險證也雖泄瀉必用石膏無論泄瀉有無當用荊防瀉白散加黃連瓜蔞各一錢或地黃白虎湯

○凡少陽人有身熱頭痛則已非輕證而兼有泄瀉則危險證也必用荊防瀉白散日二三服又連日服身熱頭痛清淨然後可免危險

○少陽人身寒腹痛泄瀉一晝夜間三四五次者當用滑石苦參湯身寒腹痛二三晝夜間無泄瀉或艱辛一次泄瀉者當用滑石苦參湯或用熟地黃苦參湯

○嘗見少陽人恆有腹痛患苦者用六味地黃湯六十貼而病愈

又見少陽人十餘年腹痛患苦一次起痛則或五六個月或三四個月一二個月叫苦者每起痛臨時急用滑石苦參湯十餘貼不痛時平心靜慮恆戒哀心怒心如此延拖一周年而病愈又見少陽人少年兒恆有滯證痞滿間有腹痛腰痛又有口眼喎斜初證者用獨活地黃湯一百日內二百貼服使之平心靜慮恆戒哀心怒心一百日而身健病愈

○古醫有言頭無冷痛腹無熱痛此言非也何謂然耶少陰人元來冷勝則其頭痛亦自非熱痛而卽冷痛也少陽人元來熱勝則其腹痛亦自非冷痛而卽熱痛也古醫又言汗多亡陽下多亡陰此言是也何謂然耶少陰人雖則冷勝然陰盛格陽敗陽外遁則煩熱而汗多也此之謂亡陽病也少陽人雖則熱勝然陽盛格陰敗陰內遁則畏寒而泄下也此之謂亡陰病也亡陽亡陰病非用

藥必死也不急治必死也

○亾陽者陽不上升而反爲下降則亾陽也亾陰者陰不下降而反爲上升則亾陰也陰盛格陽於上則陽爲陰抑不能上升於胃膈下陷大腸而外遁胸胱故背表煩熱而汗出也煩熱而汗出者非陽盛也此所謂內冰外炭陽將亾之兆也陽盛格陰於下則陰爲陽壅不能下降於胸胱上逆背膂而內遁膈裡故膓胃畏寒而泄下也畏寒而泄下者非陰盛也此所謂內炭外冰陰將亾之兆也

○少陰人病一日發汗陽氣上升人中穴先汗則病必愈也而二日三日汗不止病不愈則陽不上升而亾陽無疑也少陽人病一日滑利陰氣下降手足掌心先汗則病必愈也而二日三日泄不止病不愈則陰不下降而亾陰無疑也凡亾陽亾陰證明知醫理

者、得病前「可以預執證也得病一二日「明白易見也至于三日則雖愚者執證、亦明若觀火矣用藥必無過二三日矣四日則晚矣五日則臨危也

○少陰人平居「裡煩汗多者、得病則必成亾陽也少陽人平居「表寒下多者、得病則必成亾陰也亾陽亾陰人平居「預治補陰補陽可也不可至於亾陽亾陰得病臨危然後「救病也

○少陰人病愈之汗、入中「先汗而一次發汗、胃膈「壯快而活潑亾陽之汗「人中「或汗或不汗屢次發汗胃膈「悶躁而下陷也少陽人病愈之泄「手足掌心「先汗而一次滑泄、表氣清寧而精神、爽明亾陰之泄「手足掌心「不汗屢次泄利表氣、溯寒而精神、鬱冒

○少陰人胃家實病少陽人結胷病「正邪陰陽、相敵而相格故曰久而後「危證、始見也少陰人亾陽病少陽人亾陰病「正邪陰陽、不

敵而相格故初證已爲險證繼而因爲危證矣譬如用兵合戰交鋒初一日合戰正兵爲邪兵所敗折正兵幾許兵數二日又戰又敗又折幾許數三日又戰又敗又折幾許數以三日交鋒觀之則將愈益戰而愈益敗愈益折矣若四日復戰五日復戰則正兵之全軍覆沒可知矣所以用藥必無過三日也

○盤龍山老人者李翁所居地有盤龍山故李翁自謂盤龍山老人也此書中論曰二字無非盤龍山老人之論而此章特擧盤龍山老人者蓋亾陽亾陰最是險病而人必尋常視之易於例治故別以盤龍山老人提擧驚呼而警覺之也

○亾陰證古醫別無經驗用藥頭話而李子建朱震亨書中若干論及之然自無明的快驗蓋此病從古以來殺人孟浪甚速未暇經驗獵得裡許故也

○張仲景曰太陽病不解轉入少陽者胷下硬滿乾嘔不能食往來寒熱者尚未吐下脈沈緊者與小柴胡湯若已吐下發汗譫語柴胡證證罷此爲壞病依壞法治之

○傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽不可發汗發汗則譫語

○當治少陽人傷寒發狂譫語證時則乙亥年清明節候也少陽人一人得傷寒寒多熱少之病四五日後午未辰刻喘促短氣伊時經驗未熟但知少陽人應用藥六味湯最好之理故不敢用他藥而秖用六味湯一貼病人喘促即時頓定又數日後病人發狂譫語喘促又發又用六味湯一貼則喘促雖少定而不如前日之頓定矣病人發狂連三日午後喘促又發又用六味湯喘促略不少定有頃舌卷動風口噤不語於是而始知六味湯之無能爲也急煎白虎湯一貼以竹管吹入病人鼻中下咽而察其動靜則舌

卷口噤之證不解而病人腹中微鳴仍以兩爐煎藥荏苒灌鼻數三貼後病人腹中大鳴放氣出焉三人扶持病人竹管吹鼻灌藥而病人氣力益屈強三人扶持之力幾不能支當矣又荏苒灌鼻自未申時至亥子時凡用石膏八兩末境病人腹中大脹角弓反張之證出焉角弓反張後少頃得汗而睡翌日平明病人又服白虎湯一貼日出後滑便一次而病快愈愈後有眼病用石膏黃柏末各一錢日再服七八日後眼病亦愈伊時未知大便驗法故不察大便之秘開幾日然想必此病人先自表寒病得病後有大便秘開而發此證矣

○其後又有少陽人一人得傷寒熱多寒少之病有人教服雉肉湯仍成陽毒發斑余教服白虎湯連三貼而其人只服半貼數日後譫語而病重病家懇急顛倒往觀則病人外證昏憒已有動風

之漸而耳聾譫語舌上白胎藥囊紙有石膏一斤滑石一兩而無他藥故急煎石膏一兩滑石一錢頓服而其翌日又服石膏一兩滑石一錢此兩日則大便皆不過一晝夜至于第三日病家以過用石膏歸咎故一日不用石膏矣至于第四日病家愈急顛倒往觀則病人大便秘開兩夜一晝而語韻不分明牙關緊急水飲不入急煎石膏二兩艱辛下咽而半吐半下咽少頃牙關開而語韻則不分明如前又連用石膏一兩其翌日則以午後動風藥不下咽之慮故預爲午前用藥以備動風而又五六日用之前後用石膏凡十四兩而末境發狂數日語韻宏壯而病愈數月然後方出門庭

○其後又有少陽人一人初得頭痛身熱表寒病八九日其間用黃連瓜蔞羌活防風等屬病勢少愈而永不快祛矣仍爲發狂三

曰病家以尋常例證視之而祇用黃連瓜蔞等屬又譫語數日始用地黃白虎湯一貼其翌日午後動風急煎地黃白虎湯連三貼救急而艱辛下咽其翌日則白虎湯加石膏一兩午前用之以備動風而連三日用之病人自起坐立能大小便病勢比前快穩快壯矣不幸病加於少愈慮不周於完治此人竟不救恨不午前祇用白虎湯二貼以備動風而午後全不用藥以繼之也以此三人病觀之則發狂譫語證白虎湯非但午前用藥以備動風而已矣日用五六貼七八貼十餘貼以晝繼夜則好矣不必待譫語後而用藥發狂時當用藥可也不必待發狂後而用藥發狂前早察發狂之漸可也

○其後又有一少陽人十七歲女兒素證間有悸氣食滯腹痛矣忽一日頭痛寒熱食滯有醫用蘇合元三箇薑湯調下仍爲泄瀉

日數十行十餘日不止引飲不眠間有譫語證時則己亥年冬十一月二十三日也卽夜用生地黃石膏各六兩知母三兩其夜泄瀉度數減半其翌日用荊防地黃湯加石膏四錢二貼連服安睡而能通小便荊防地黃湯二貼藥力十倍於知母白虎湯可知矣於是每日用此藥四貼晝二貼連服夜二貼連服數日用之泄瀉永止頭部兩鬢有汗而病兒譫語證變爲發狂證病家驚惑二晝夜疑不用藥病勢遂危頭汗不出小便秘結口噤冰片不省人事又象可惡矣勢無柰何以不得已之計一夜間用荊防地黃湯加石膏一兩連十貼灌口其夜小便通三碗狂證不止然知人看面稍有知覺其翌日又用六貼連五日用四五六貼發狂始止夜間或要時就睡然不能久睡便覺又日用三四貼連五日頭頂兩鬢有汗而能半時刻就睡稍進粥飲少許其後每日荊防地黃湯

加石膏一錢日二貼用之大便過一日則加四錢至于十二月二十三日始得免危能起立房室中一朔內凡用石膏四十五兩新年正月十五日能行步一里地而來見我其後又連用荊防地黃湯加石膏一錢至于新年三月

○論曰少陽人病以火熱爲證故變動甚速初證不可輕易視之也凡少陽人表病有頭痛裡病有便秘則已爲重病也重病不當用之藥一二三貼誤投則必殺人險病危證當用之藥一二三貼不及則亦不救命

少陽人胃受熱裏熱病論

張仲景曰太陽病八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐面色反有熱色者未欲解也不能得小汗出身必痒宜桂麻各半湯

○太陽病以瘧發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此陽也身不痒不可發汗宜桂婢各半湯

○論曰此證大便不過一晝夜而通者當用荊防瀉白散大便過一晝夜而不通者當用地黃白虎湯

○張仲景曰陽明證小便不利脈浮而渴猪苓湯主之

○三陽合病頭痛面垢譫語遺尿中外俱熱自汗煩渴腹痛身重白虎湯主之

○論曰陽明證者但熱無寒之謂也三陽合病者太陽少陽陽明證俱有之謂也此證當用猪苓湯白虎湯然古方猪苓湯不如新方猪苓車前子湯之俱備古方白虎湯不如新方地黃白虎湯之全美矣若陽明證小便不利者兼大便秘澁則當用地黃白虎湯

○朱肱曰陽厥者初得病必身熱頭痛外有陽證至四五日方發

厥厥至半日却身熱蓋熱氣淺方能發厥若微厥却發熱者熱甚故也其脈雖伏按之滑者爲裏熱或飲水或揚手躑足或煩躁不得眠大便秘小便赤外證多昏憒用白虎湯

○論曰少陽人裏熱病地黃白虎湯爲聖藥而用之者必觀於大便之通不通也大便一晝夜有餘而不通則可用也二晝夜不通則必用也凡少陽人大便一晝夜不通則胃熱已結也二晝夜不通則熱重也三晝夜不通則危險也一晝夜八九辰刻二晝夜恰好用之無至三晝夜之危險若譫語證便秘則不可過一晝夜

○少陽人胃受熱則大便燥也脾受寒則泄瀉也故亡陰證泄瀉二三日而大便秘一晝夜則清陰將亡而危境也胃熱證大便三晝夜不通而汗出則清陽將竭而危境也

○少陽人大便不通病用白虎湯三四服當日大便不通者將爲

融會貫通大吉之兆也不必疑惑而翌日又服二三貼則必無不通

○少陽人表裡病結解必觀於大便而少陽人大便頭燥尾滑體大而疏通者平時無病者之大便也其次大滑便一二次快滑泄廣多而止者有病者之病快解之大便也其次一二次尋常滑便者有病者病勢不加之大便也其次或過一晝夜有餘不通或一晝夜間三四五次小小滑利者將澁之候也非好便也宜預防

○少陰人裡寒病臍腹冷證受病之初已有腹鳴泄瀉之機驗而其機甚顯則其病執證易見而用藥可早也少陽人裡熱病胷膈熱證受病之初雖有胷煩悶躁之機驗而其機不甚顯則執證難見而用藥太晚也若使少陽人病胷煩悶躁之驗顯然露出使人可覺則其病已險而難爲措手矣凡少陽人表病有頭痛則自是

表病明白易見之初證也若復引飲小便赤則可畏也泄瀉揚手擲足則大畏也少陽人裡病大便過一晝夜有餘而不通則自是裡病明白易見之初證也若復大便過三晝夜不通則危險矣背癰腦疽唇瘭纏喉風咽喉等病受病之日已爲危險證也陽毒發斑流注丹毒黃疸等病受病之日已爲險證也面目口鼻牙齒之病成病之日皆爲重證也凡少陽人表病有頭痛證則必用荊防敗毒散裡病有大便過一晝夜不通證則用白虎湯

○王好古曰渴病有三曰消渴曰消中曰消腎熱氣上騰胃中煩躁古赤唇紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦謂之消渴熱蓄於中消穀善飢飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩小便數而甜病屬中焦謂之消中熱伏於下腿膝枯細骨節痠疼飲水不多隨卽尿下小便多而濁病屬下焦謂之消腎又有五石過度之人

眞氣既盡石勢獨留陽道興強不交精泄謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎尤甚焉若強中則其斃可立而待也

○朱震亨曰上消者舌上赤裂大渴引飲白虎湯主之中消者善食而瘦自汗大便硬小便數黃連豬肚丸主之下消者煩躁引飲小便如膏腿膝枯細六味地黃湯主之

○醫學綱目曰渴而多飲爲上消消穀善飢爲中消渴而尿數有膏油爲下消

○危亦林曰因眈嗜色慾或服丹石眞氣既脫熱邪獨盛飲食如湯消雪肌膚日削小便如膏油陽強興盛不交精泄三消之中最爲難治

○論曰消渴者病人胃次不能寬遠關達而陋固膠小所見者淺所欲者速計策鶻突意思艱乏則大腸清陽上升之氣自不快足

日月耗困而生此病也胃局清陽上升而不快足於頭面四肢則成上消病大腸局清陽上升而不快足於胃局則成中消病上消自爲重證而中消倍重於上消中消自爲險證而下消倍險於中消上消宜用凉膈散火湯中消宜用忍冬藤地骨皮湯下消宜用熟地黃苦參湯尤宜寬濶其心不宜膠小其心寬濶則所欲必緩清陽上達膠小則所欲必速清陽下耗

○平心靜思則陽氣上升輕清而充足於頭面四肢也此元氣也清陽也勞心焦思則陽氣下陷重濁而鬱熱於頭面四肢也此火氣也耗陽也

○危亦林曰消渴須防發癰疽忍冬藤不拘多少根莖花葉皆可服

○李杲曰消渴之疾能食者末傳必發腦疽背瘡不能食者必傳

中滿鼓脹㐂

○東醫醫方類聚曰消渴之病變成發癰疽或成水病或雙目失明㐂

○論曰癰疽眼病皆是中消之變證也中消自爲險證則上消當早治也中消必急治也下消則濱死㐂

○王好古曰一童子自嬰至童年盜汗七年諸藥不效服凉膈散三日病已㐂

○論曰少陽人大腸清陽快足於胃充溢於頭面四肢則汗必不出也少陽人汗者自是陽弱也而服凉膈散病已則此病卽上消而其病輕也㐂

○東醫醫方類聚曰夫渴者數飲水其人必頭面眩背寒而嘔因虛故也㐂

○龔信曰凡陰虛證每日午後惡寒發熱至晚亦得微汗而解誤作瘧治多致不救

○孫思邈千金方書曰消渴宜慎者有三一飲酒二房勞三醎食及麵能慎此三者雖不服藥亦可自愈

○論曰上消中消裡陽升氣雖則虛損表陰降氣猶恃完壯故其病雖險猶能歲月支撐者以此也若夫陰虛午熱飲水背寒而嘔者表裡陰陽俱爲虛損所以爲病尤險與下消略相輕重然能善攝身心服藥則十之六七尚可生也不善攝身心服藥則百之百必死也此證當用獨活地黃湯十二味地黃湯

○易之需九三爻辭曰需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也以此意而倣之曰陰虛午熱背寒而嘔其病雖險然死尚在外也能齋戒其心恭敬其身又服好藥不死也

泛論

少陽人病中風吐血嘔吐腹痛食滯痞滿五證同出一屬而自有輕重浮腫喘促結胷痢疾寒熱往來胷脅滿五證同出一屬而自有輕重

○少陽人中風半身不遂一臂不遂末如何之疾也重者必死輕者猶生間以服藥安而復之待其自愈而不可期必治法之疾也

○少陽人吐血者必蕩滌剛愎偏急與人並驅爭塗之淡食服藥修養如釋道一百日則可以少愈二百日則可以大愈一周年則可以快愈三周年則可保其壽凡吐血調養失道則必再發再發則前功皆歸於虛地若再發者則又自再發日計數一百日少愈一周年快愈若十年二十年調養則必得高壽

○凡少陽人間有鼻血少許或口鼻間痰涎中有血雖細微皆吐

血之屬也又口中暗有冷涎逆上者雖不嘔吐亦嘔吐之屬也少年有此證者多致夭折以其等閒任置故也此二證必在重病險病之列不可不預防服藥永除病根然後可保無虞

○中風受病太重故治法不可期必吐血受病猶輕故治法可以期必中風吐血調養爲主服藥次之嘔吐以下腹痛食滯痞滿服藥調養則其病易愈

○中風嘔吐宜用獨活地黃湯吐血宜用十二味地黃湯

○浮腫爲病急治則生不急治則危用藥早則容易愈也用藥不早則孟浪死也此病外勢平緩似不速死故人必易之此病實是急證四五日內必治之疾謾不可以十日論之也浮腫初發當用木通大安湯或荊防地黃湯加木通日再服則六七日內浮腫必解浮腫解後百日內必用荊防地黃湯加木通二三錢每日一二

貼用之以清小便以防再發再發難治浮腫初解飲食亦宜忍飢而小食若如平人大食則必不免再發大畏小便赤也小便清則浮腫解小便赤則浮腫結

○少陽人中消者腹脹則必成鼓脹鼓脹不治少陽人鼓脹病如少陰人藏結病皆經歷五六七八月或周年而竟死蓋少陰人藏結表陽溫氣雖在幾絕裡陰溫氣猶恃完壯少陽人鼓脹裡陽清氣雖在幾絕表陰清氣猶恃完壯故皆經歷久遠而死也

○少陽人傷寒喘促宜先用靈砂一分溫水調下因煎荊防瓜蔞等藥用之則必無煎藥時刻遲滯救病

○靈砂藥力急迫可以一再用而不可屢用蓋救急之藥敏於救急而已藥必湯服然後充滿腸胃能爲補陰補陽

○痢疾之比結胷則痢疾爲順證也而痢疾之謂重證者以其與

浮腫相近也嘔吐之比腹痛則嘔吐爲逆證也而嘔吐之謂惡證者以其距中風不遠也

○少陽人痢疾宜用黃連清腸湯

○少陽人瘧病有間兩日發者卽勞瘧也可以緩治不可急治此證瘧不發日用獨活地黃湯二貼朝暮服瘧發日預煎荊防敗毒散二貼待惡寒發作時二貼連服一月之內以獨活地黃湯四十貼荊防敗毒散二十貼爲準的則其瘧必無不退之理

○少陽人內發咽喉外腫項頰者謂之纏喉風二三日內殺人最急又上唇人中穴瘭謂之唇瘭凡人中左右逼近處一指許發瘭雖微如粟粒亦危證也此二證始發而輕者當用凉膈散火湯陽毒白虎湯重者當用水銀熏鼻方一炷熏鼻而項頰汗出則愈若倉卒無熏鼻藥則輕粉末一分五厘乳香沒藥甘遂末各五分和

勻糊丸一服盡
○少陽人小兒食多肌瘦宜用蘆薈肥兒丸忍冬藤地骨皮湯
○嘗見少陽人肩上有毒瘡火熬香油灌瘡肌肉焦爛而不知其熱有醫教以牛角片置火炭上燒而熏之煙入瘡口毒汁自流其瘡立愈
○嘗見少陽人七十老人發腦疽有醫教以河豚卵作末傅之其疽立愈河豚卵至毒竊犬食之則立死掛於林木間烏鵲不敢食
○嘗治少陽人蛇頭瘡河豚卵作末少許點膏藥上傅之而一日一次易以新末傅藥五六日病效而新肉急生而有妬肉因以磨刀砥末傅之妬肉立消而病愈又用之於連珠瘰多日傅之者必效用之於爲炭火所傷與狗咬蟲咬無不得效
○嘗治少陽人六十老人中風一臂不遂病用輕粉五厘其病輒

加少陽人二十歲少年一脚微不仁痺風用輕粉甘遂龍虎丹二三次用之得效

○嘗治少陽人咽喉水醬不入大便不通三日病至危境用甘遂天一丸即效

○嘗治少陽人七十老人大便四五日不通或六七日不通飲食如常兩脚膝寒無力用輕粉甘遂龍虎丹大便即通後數日大便又秘則又用屢次用之竟以大便一日一度爲準而病愈此老竟得八十壽

○嘗見少陽人當門二齒齦縫血出頃刻間數碗將至危境有醫教以火熬香油以新綿點油乘熱灼齒縫仍爲血止

○嘗見少陽人一人每日一次梳頭數月後得口眼喎斜病其後又見少陽人日梳得喎斜病者凡三人蓋日梳少陽人禁忌也嘗

見之陰人八十老人日梳者乞老人自言日日梳不好我之日梳已爲四十年云次

張仲景傷寒論中少陽人病經驗設方藥十方

白虎湯

石膏五錢 知母二錢 甘草七分 粳米半合

猪苓湯

猪苓、赤茯苓、澤瀉、滑石、阿膠各一錢

五苓散

澤瀉二錢五分 赤茯苓、猪苓、白朮各一錢五分 肉桂五分

小柴胡湯

柴胡三錢 黄芩二錢 人參、半夏各一錢五分 甘草五分

大青龍湯

六味地黃湯

熟地黃四錢 山藥、山茱萸各二錢 澤瀉、牧丹皮、白茯苓各一錢五分 ○此方、出於虞博醫學正傳書中、治虛勞 ○今考更定、此方中、山藥一味、肺藥也

生熟地黃丸

生乾地黃、熟地黃、玄參、石膏各一兩 糊丸梧子大、空心茶清下五七十丸 ○此方、出於李樗醫學入門書中、治眼昏

導赤湯

木通、滑石、黃柏、赤茯苓、生地黃、山梔子、甘草梢各一錢 枳殼、白朮各五分 ○此方、出於龔信萬病回春書中、治尿如米泔色、不過二服愈 ○今考更定、此方、當去枳殼、白朮、甘草

荊防敗毒散

羌活、獨活、柴胡、前胡、赤茯苓、荆芥穗、防風、枳殼、桔梗、川芎、人參、甘草各一錢 薄荷少許 ○治傷寒時氣發熱頭痛項強肢體煩疼○今考要定此方當去枳殼桔梗川芎人參甘草（此方出於某書疊出故省略下同）

肥兒丸

胡黃連五錢 使君子肉四錢五分 人參 黃連 神麴 麥葉 山查肉各三錢五分 白茯苓 白朮 甘草炙各三錢 蘆薈煅二錢五分 右爲末黃米糊和丸綠豆大米飲下二三十丸○治小兒疳積○今考要定此方當去人參白朮山查肉甘草而使君子一味未能經驗的知藥性故不敢輕論

消毒飲

牛蒡子二錢 荆芥穗一錢 生甘草 防風各五分 ○治痘不快出及

胃前稠密急用三四服快透解毒神效右三方出於龔信醫鑑書中○今考叟定此方當去甘草

水銀熏鼻方

黑鉛水銀各一錢朱砂乳香沒藥各五分血蝎雄黃沈香各三分右爲末和勻捲作紙燃七條用香油點燈放床上令病人放兩脚包住上用單被通身蓋之口噤凉水頻換則不損口初日用三條後日每用一條熏鼻○此方出於朱震亨丹溪心法書中治楊梅天疱瘡甚奇

○論曰水銀破積熱清頭目制陽曰陰於下焦爲少陽人抑陽扶陰藥中無敵之藥而秖可用之於當日救急之用不可用之於連日補陰之用者以其拔山扛鼎之力一舉而直搗大敵之巢穴再舉則敵已解散反有倒戈之患故也纏喉風必用之藥

○少陽人一脚不遂兩脚不遂者輕粉末五厘或一分連三日服無論病之瘥不瘥必不過三日服又不過日服五厘或一分謹風冷愼禁忌一臂不遂半身不遂口眼喎斜不可用用之必危○急病可以急治緩病不可以急治輕粉劫藥不可銳意用之以望速效緩病緩愈然後可謂眞愈緩病速效則終必更病難治有連三日用之者有間一二三日服連三次用之者

○嘗見少陽人咽喉病眼鼻病脚痺病用水銀連三四日或熏鼻或内服病愈者病愈後一月之内必不可内處冷外觸風尤不可任意洗手洗面更着新衣梳頭也犯此禁者必死又不可冷室冷室則觸冷而猝死又不可燠室燠室則煩熱開牖觸風而亦猝死此皆目擊者也一人病愈十餘日更着新衣而猝死一人病愈二十日後梳頭而猝死一人咽喉病熏鼻初日二條翌日一條當夜

燠室觸風而猝死時俗服水銀者忌塩醬者以醬中有豆豉能解水銀毒故也然毒藥解毒容或無妨則不必苟忌塩醬尽

新定少陽人病應用要藥十七方

荆防敗毒散

羌活、獨活、柴胡、前胡、荆芥、防風、赤茯苓、生地黄、地骨皮、車前子各一錢

右方、治頭痛寒熱往來者宜用

荆防導赤散

生地黄三錢 木通二錢 玄參、瓜蔞仁各一錢五分 荆芥、防風各一錢

右方、治頭痛胃膈煩熱者宜用

荆防瀉白散

生地黃三錢茯苓、澤瀉各二錢石膏、知母、羌活、獨活、荊芥、防風各一錢

右方、治頭痛脇胱煩躁者宜用

猪苓車前子湯

澤瀉、茯苓各二錢猪苓、車前子各一錢五分知母、石膏、羌活、獨活、荊芥、防風各一錢

右方、治頭腹痛有泄瀉者宜用

滑石苦參湯

澤瀉、茯苓、滑石、苦參各二錢川黃連、黃柏、羌活、獨活、荊芥、防風各一錢

右方、治腹痛無泄瀉者宜用

獨活地黃湯

熟地黃四錢 山茱萸二錢 茯苓、澤瀉各一錢五分 牧丹皮、防風、獨活各一錢

右方、治食滯痞滿者宜用

荊防地黃湯

熟地黃、山茱萸、茯苓、澤瀉各二錢 車前子、羌活、獨活、荊芥、防風各一錢

咳嗽加前胡、血證加玄參、牧丹皮、偏頭痛加黃連、牛蒡子、食滯痞滿者、加牧丹皮、有火者、加石膏、頭痛煩熱、與血證者、用生地黃、加石膏者、去山茱萸。荊芥、防風、羌活、獨活、俱是補陰藥、荊防、大清胃膈散風、羌獨、大補胸脘、眞陰、無論頭腹痛痞滿泄瀉、凡虛弱者、數百貼用之、無不必效、屢試屢驗

十二味地黃湯

熟地黃四錢 山茱萸二錢 白茯苓、澤瀉各一錢五分 牧丹皮、地骨皮、玄參、枸杞子、覆盆子、車前子、荊芥、防風各一錢

地黃白虎湯

石膏五錢或一兩 生地黃四錢 知母二錢 防風、獨活各一錢

陽毒白虎湯

石膏五錢或一兩 生地黃四錢 知母二錢 荊芥、防風、牛蒡子各一錢

右方、治陽毒發斑便秘者宜用

涼膈散火湯

生地黃忍冬藤、連翹各二錢 山梔子、薄荷、知母、石膏、防風、荊芥各一錢

右方、治上消者宜用

忍冬藤地骨皮湯

忍冬藤四錢 山茱萸 地骨皮各二錢 川黃連 黃柏 玄參 苦參 生地黃 知母 山梔子 枸杞子 覆盆子 荊芥 防風 金銀花各一錢

右方治中消者宜用

熟地黃苦參湯

熟地黃四錢 山茱萸二錢 白茯苓 澤瀉各一錢五分 知母 黃柏 苦參各一錢

右方治下消者宜用

木通大安湯

木通 生地黃各五錢 赤茯苓二錢 澤瀉 車前子 川黃連 羌活 防風 荊芥各一錢

右方治浮腫者宜用險病始終用藥當至百餘貼 黃連 澤瀉 爲

貴材則貧者或去連澤

黃連清腸湯

生地黃四錢 木通 茯苓 澤瀉各二錢 猪苓 車前子 川黃連 羌活 防風各一錢

右方治痢疾者宜用去木通二錢加荊芥一錢痲疾者宜用

朱砂益元散

滑石二錢 澤瀉一錢 甘遂五分 朱砂一分

右爲末溫水或井華水調服夏月滌暑宜用

甘遂天一丸

甘遂末一錢 輕粉末一分 和勻糊丸分作十丸朱砂爲衣

作丸乾久則堅硬難和每用時以紙二三疊包裹以杵搗碎作麤末三四五匕口含末因飲井華水和下候三四辰刻內不下

利則再用二丸下利三度爲適中、六度爲快過、預煎米飲、下利二三度、因進米飲、否則氣陷而難堪耐、治結胷水入還吐、甘遂一錢輕粉五分、分作十丸則名曰輕粉甘遂龍虎丹、輕粉、甘遂、各等分作十丸則名曰輕粉甘遂雌雄丹、輕粉一錢、乳香、沒藥、甘遂各五分、分作三十丸則名曰乳香沒藥輕粉丸、輕粉發汗、甘遂下水、輕粉藥力、一分則快足、五厘則無不及、甘遂藥力、一分五厘則快足、七八厘則無不及、輕粉甘遂、自是毒藥、俱不可輕易過一分用之、斟酌輕重、病欲頭腦滌、火則輕粉爲君、病欲胷膈下水則甘遂爲君

右少陽人藥諸種、不可炮炙炒煨用

太陰人胃脘受寒表寒病論

張仲景曰太陽傷寒頭痛發熱身疼腰痛骨節皆痛惡寒無汗而喘麻黃湯主之○註曰傷寒頭痛身疼腰痛以至牽連百骨節俱痛者此太陽傷寒榮血不利故也○論曰此卽太陰人傷寒背顧表病輕證也此證麻黃湯非不當用而桂枝甘草皆爲蠹材此證當用麻黃發表湯○張仲景曰傷寒四五日而厥者必發熱厥深者熱亦深厥微者熱亦微傷寒厥四日熱反三日復厥五日厥多熱少其病爲進傷寒發熱四日厥反三日厥少熱多其病當自愈○論曰此謂之厥者但惡寒不發熱之謂也非手足厥逆之謂也太陰人傷寒表證寒厥四五日後發熱者重證也此證發熱其汗

必自髮際而始通於額上又數日後發熱而眉稜通汗又數日後發熱而顴上通汗又數日後發熱而唇頤通汗又數日後發熱而胷臆通汗也而額上之汗數次而後達於眉稜眉稜之汗數次而後達於顴上顴上之汗數次而後達於唇頤唇頤之汗不過一次而直達於胷臆矣此證首尾幾近二十日凡寒厥六七次而後病解也此證俗謂之長感病凡太陰人病先額上眉稜有汗而一汗病不解屢汗病解者名曰長感病

○太陰人病寒厥六七日而不發熱不汗出則死也寒厥二三日而發熱汗出則輕證也寒厥四五日而發熱得微汗於額上者此之謂長感病其病爲重證也此證原委勞心焦思之餘胃脘衰弱而表局虛薄不勝寒而外被寒邪所圍正邪相爭之形勢客勝主弱譬如一團孤軍困在垓心幾於全軍覆沒之境先鋒一隊倖而

跳出凌圍一面僅得開路後軍全隊尚在垓心將又屢次力戰然後方爲出來則爻象正是凜凜之勢也額上通汗者即先鋒一隊凌圍跳出之象也眉稜通汗者即前軍全隊凌圍全面氣勢勇敢之象也顴上通汗者中軍半隊緩緩出圍之象也此病汗出眉稜則快免危也汗出顴上則必無危也

○太陰人汗無論額上眉稜上顴上汗出如黍粒發熱稍久而還入者正強邪弱快汗也汗出如微粒或淋漓無粒作時而還入者正弱邪強非快汗也

○太陰人背部後面自腦以下有汗而面部髮際以下不汗者死證也全面皆有汗而耳門左右不汗者死證也太凡太陰人汗始自耳後高骨面部髮際大通於胷膈而病解也髮際之汗始免死也額上之汗僅免危也眉稜之汗快免危也顴上之汗生路寬

闊也唇頤之汗病已解也胃臆之汗病大解也嘗見此證額上汗欲作眷稜汗者寒厥之勢不甚猛也顴上汗欲作唇頤汗者寒厥之勢甚猛至於寒戰叩齒完若動風而其汗直達兩腋張仲景所云厥深者熱亦深厥微者熱亦微蓋謂此也此證寒厥之勢多日者病重之勢也寒厥之勢猛峻者非病重之勢也

○此證京畿道人謂之長感病咸鏡道人謂之四十日痛或謂之無汗乾病時俗所用荊防敗毒散藿香正氣散補中益氣湯個個誤治惟熊膽雖或旨人直門然又連用他藥病勢更變古人所云病不能殺人藥能殺人者不亦信乎百病加減之勢以凡眼目觀之固難推測而此證又有甚焉此證之汗在眷稜顴上時雖不服藥亦自愈矣而病人招醫妄投誤藥則顴上之汗還為額上之汗而外證寒厥之勢則稍減矣於是焉醫師自以為信藥效病人亦

自以爲得藥效又數日誤藥則額上之汗又不通而死矣此證當以汗之進退占病之輕重不可以寒之寬猛占病之輕重張仲景曰其病當自愈云者豈非珍重無妄之論乎然長感病無疫氣者待其自愈則好也而瘟病疫氣重者若明知證藥無疑則不可尋常置之待其勿藥自愈恐生奇證

○論曰太陰人病寒厥四日而無汗者重證也寒厥五日而無汗者險證也當用熊膽散或寒多熱少湯加蠐螬五七九箇大便滑者必用乾栗薏苡仁等屬大便燥者必用葛根大黃等屬若額上省稜上有汗則待其自愈而病解後用藥調理否則恐生後病

○嘗治太陰人胃脘寒證瘟病有一太陰人素有怔忡無汗氣短結咳矣忽焉又添出一證泄瀉數十日不止卽表病之重者也用太陰調胃湯加椶根皮一錢曰再服十日泄瀉方止連用三十日

每日流汗滿面素證亦減而忽其家五六人一時瘟疫此人緣於救病數日不服藥矣此人又染瘟病瘟證粥食無味全不入口仍以太陰調胃湯加升麻黃芩各一錢連用十日汗流滿面疫氣少減而有二日大便不通之證仍用葛根承氣湯五日而五日內粥食大倍疫氣大減而病解又用太陰調胃湯加升麻黃芩四十日調理疫氣既減素病亦完○結咳者勉強發咳痰欲出不出而或出曰結咳少陰人結咳謂之胃結咳太陰人結咳謂之頷結咳○大凡瘟疫先察其人素病如何則表裡虛實可知已素病寒者得瘟病則亦寒證也素病熱者得瘟病則亦熱證也素病輕者得瘟病則重證也素病重者得瘟病則險證也

○有一太陰人素病咽嗌乾燥而面色青白表寒或泄蓋咽嗌乾燥者肝熱也面色青白表寒或泄者胃脫寒也此病表裡俱病素

病之太重者也此人得瘟病其證自始發日至于病解二十日大便初滑或泄中滑末乾每日二三四次無日不通初用寒多熱少湯病解後用調理肺元湯四十日調理僅僅獲生○此病始發大便或滑或泄而六日內有額汗眷稜汗顴汗飲食起居有時如常六日後始用藥七日全體面部髮際以下至于唇頤汗流滿面淋漓洽足而汗後面色帶青有語訥證八日九日語訥耳聾而唇汗還爲顴汗顴汗還爲眷稜汗汗出微粒乍出乍入而只有額汗呼吸短喘矣至于十日夜額汗還入而語訥耳聾尤甚痰涎壅喉口不能咯病人自以手指探口拭之而出十一日呼吸短喘尤甚至于十二日忽然食粥二碗斯時若論其藥則熊膽散或者可也而熊膽闕材自念此人今夜必死矣當日初昏呼吸暫時少定十三日鷄鳴時髮際有汗十四日十五日連三日食粥二三碗額汗眷

稜汗顴汗次次發出面色脫青十六日臆汗始通稍能咯痰語訥亦愈至于二十日臆汗數次大通遂能起立房中諸證皆安而耳聾證則自如也病解後用藥調理四十日耳聾目迷自祛

太陰人肝受熱裡熱病論

朱肱曰陽毒面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血宜葛根解肌湯黑奴丸陽毒及壞傷寒醫所不治精魄已竭心下尚煖幹開其口灌黑奴丸藥下咽即活

○李梴曰微惡寒發熱宜葛根解肌湯目疼鼻乾潮汗閉澁滿渴狂譫宜調胃承氣湯熱在表則目疼不眠宜解肌湯熱入裡則狂譫宜調胃承氣湯

○龔信曰陽明病目疼鼻乾不得臥宜葛根解肌湯

○三陽病變爲陽毒面赤眼紅身發斑黃或下利黃赤六脈洪大宜黑奴丸

○論曰右諸證當用葛根解肌湯黑奴丸
○靈樞曰尺膚熱甚脈盛燥者病瘟也
○王叔和曰瘟病脈陰陽俱盛病熱之極浮之而滑沈之散澁
○脈法曰瘟病二三日體熱腹滿頭痛食飲如故脈直而疾八日死瘟病四五日頭痛腹滿而吐脈來細而強十二日死八九日頭身不痛目不赤色不變而反利脈來澁按之不足舉時大心下堅十七日死
○龔信曰瘟病穰穰大熱脈細小者死瘟病下利痛甚者死
○萬曆丙戌余寓大梁瘟疫大作士民多斃其證增寒壯熱頭面項頰赤腫咽喉腫痛昏憒余發一秘方名二聖救苦丸大黃四兩猪牙皂角二兩麪糊和丸菉豆大五七十九一服卽汗一汗卽愈稟壯者百發百中皂角開關竅發其表大黃瀉諸火通其裡

○感四時不正之氣使人痰涎壅盛煩熱頭疼身痛增寒壯熱項強睛疼或飲食如常起居依舊甚至聲啞或赤眼口瘡大小腮腫喉痺咳嗽稠粘噴嚏

○論曰右諸證增寒壯熱燥澁者當用皂角大黃湯葛根承氣湯頭面項頰赤腫者當用皂角大黃湯葛根承氣湯體熱腹滿自利者熱勝則裡證也當用葛根解肌湯寒勝則表證而太重證也當用太陰調胃湯加升麻黃芩

○嘗治太陰人肝熱熱證瘟病有一太陰人素病數年來眼病時作時止矣此人得瘟病自始發日用熱多寒少湯三四五日大便或滑或泄至六日有大便一日不通之證仍用葛根承氣湯連三日粥食大倍又用三日疫氣大減病解後復用熱多寒少湯大便燥澁則加大黃一錢滑泄太多則去大黃如此調理二十日其人完健

○此病始發嘔逆口吐昏憒不省重痛矣末境反爲輕證十

二日而病解

○一太陰人十歲兒得裡熱瘟病粥食全不入口藥亦不入口壯熱穰穰有時飲冷水至于十一日則大便不通已四日矣恇怯譫語曰有百蟲滿室又有鼠入懷云奔遑匍匐驚呼啼泣有時熱極生風兩手厥冷兩膝伸而不屈急用葛根承氣湯不憚啼泣強灌口中即日粥食大倍疫氣大解俾而得生○此病始發四五日飲食起居如常無異平人矣末境反爲重證十七日而病解

○內經曰諸澁枯涸皺揭皆屬於燥

○論曰太陰人面色青白者多無燥證面色黃赤黑者多有燥證藍肝熱肺燥而然也嘗治太陰人燥熱證手指焦黑瘛瘲病自左手中指焦黑無力二年內一指黑血凝過掌心而掌背浮腫以刀斷指矣又一年內瘛瘲遍滿全體大者如大錢小者如小錢得

病已爲三年而以壯年人手力不能役勞一半刻足力不能日行步三十里以熱多寒少湯用藁本二錢加大黃一錢二十八貼用之大便始滑不過一二日又秘燥又用二十貼大便不甚滑泄而面部瘢瘡少差手力足力稍快有效矣又用二十貼其病快差

○靈樞曰二陽結謂之消飲一溲二死不治○註曰二陽結謂胃及大腸熱結也

○扁鵲難經曰消渴脈當得緊實而數反得沈濇而微者死

○張仲景曰消渴病小便反多如飲水一斗小便亦一斗腎氣丸主之

○論曰此病非少陽人消渴也卽太陰人燥熱也此證不當用腎氣丸當用熱多寒少湯加藁本大黃

○嘗治太陰人年五十近衰者燥熱病引飲小便多大便秘者用

熱多寒少湯用藁本二錢加大黃一錢二十貼得效矣後一月餘用他醫藥五貼此人更病復用熱多寒少湯加藁本大黃五六十貼用藥時間其病僅僅支撐後終不免死又嘗治太陰人年少者燥熱病用此方三百貼得支撐一周年此病亦不免死此人得病一周年或間用他醫方未知緣何故也蓋燥熱至於飲一溲二而病劇則難治凡太陰人大便秘燥小便覺多而引飲者不可不早治豫防

○此病非必不治之病也此少年得病用藥一周年後方死蓋此病原委後藥無厭慾火外馳肝熱大盛肺燥太枯之故也若此少年安心滌慾一百日而用藥則焉有不治之理乎蓋自始病日至于終死日慾火無日不馳故也諺曰先祖德澤雖或不得一一個報而恭敬德澤必無一一不受報凡無論某病人恭敬其心蕩滌

慾火安靜善心一百日則其病無不愈二百日則其人無不完恭敬德澤之個個受報百事皆然而疾病尤甚

○危亦林曰陰血耗竭耳聾目暗脚弱腰痛宜用黑元丹

○凡男子方當壯年而眞氣猶怯此乃稟賦素弱非虛而然滋益之方羣品稍衆藥力細微難見功效但固天元一氣使水升火降則五臟自和百病不生宜用拱辰丹

○論曰此證當用黑元與拱辰丹當歸山茱萸皆爲蠹材藥力未全欲收全力宜用拱辰黑元丹鹿茸大補湯

○太陰人證有食後痞滿腿脚無力病宜用拱辰黑元丹鹿茸大補湯太陰調胃湯調胃升清湯

○太陰人證有泄瀉病表寒證泄瀉當用太陰調胃湯表熱證泄瀉當用葛根蘿蔔子湯

○太陰人證有咳嗽病宜用太陰調胃湯鹿茸大補湯拱辰黑元丹

○太陰人證有哮喘病重證也當用麻黃定喘湯

○太陰人證有胃腹痛病危險證也當用麻黃定痛湯

○太陰人小兒有泄瀉十餘次無度者必發慢驚風宜用補肺元湯豫備慢風

○太陰人有腹脹浮腫病當用乾栗蠐螬湯此病極危險證而十生九死之病也雖用藥病愈三年內不再發然後方可論生戒侈樂禁嗜慾三年內宜恭敬心身調養愼攝必在其人矣凡太陰人病若待浮腫已發而治之則十病九死也此病不可以病論之而以死論之可也然則如之何其可也凡太陰人勞心焦思屢謀不成者或有久泄久痢或痲病小便不利食後痞滿腿脚無力病皆

浮腫之漸已爲重險病而此時以浮腫論而湯滌慾火恭敬其心用藥治之可也

○太陰人證有夢泄病一月內三四發者虛勞重證也大便秘一日則宜用熱多寒少湯加大黃一錢每日不秘則加龍骨減大黃或用拱辰黑元丹鹿茸大補湯此病出於謀慮太多思想無窮

○太陰人證有卒中風病胷膈格格有窒塞聲而目瞪者必用瓜蒂散手足拘攣眼合者常用牛黃清心丸素面色黃赤黑者多有目瞪者素面色青白者多有眼合者面色青白而眼合者手足拘攣則其病急危也不必待拘攣但見眼合而素面色青白者必急用清心丸古方清心丸每每神效目瞪者亦急發而稍緩死眼合者急發急死然目瞪者亦不可以緩論而急治之

○牛黃清心丸非家家必有之物宜用遠志石菖蒲末各一錢灌口因以皂角末三分吹鼻此證手足拘攣而頂直則危也傷人以兩手執病人兩手腕左右撓動兩肩或執病人足腕屈伸兩脚太陰人中風撓動病人肩脚好也少陽人中風大忌撓動病人手足又不可抱人起坐少陰人中風傷人抱病人起坐則可也而不可撓動兩肩可以徐徐按摩手足

○中風吐瀉宜用麝香

張仲景傷寒論中、太陰人病經驗設方藥四方（舊本）

麻黃湯

麻黃三錢 桂枝二錢 甘草六分 杏仁十枚 薑三片 棗二枚

桂麻各半湯

麻黃一錢五分 白芍藥、桂枝、杏仁各一錢 甘草七分 薑三片 棗二

枚

調胃承氣湯

大黃四錢芒硝二錢甘草一錢

大柴胡湯

柴胡四錢黃芩白芍藥各二錢五分大黃二錢枳實一錢五分○治少陽轉屬陽明身熱不惡寒反惡熱大便硬小便赤譫語腹脹潮熱

唐宋明三代醫家著述中太陰人病經驗行用要藥九方（舊本）

石菖蒲遠志散

石菖蒲遠志爲細末每服一錢酒飲任下日三令人耳目聰明○此方出於孫思邈千金方書中

調中湯

大黃一錢五分 黃芩、桔梗、葛根、白朮、白芍藥、赤茯苓、蒙本、甘草各一錢 ㊀治夏發燥疫、口乾咽塞〇今考更定、此方、當去白朮、芍藥、茯苓、甘草

黑奴丸

麻黃、大黃各二兩 黃芩、釜底煤、亾硝、竈突墨、楪上塵、小麥奴各一兩 右爲末、蜜丸彈子大每一丸新汲水和服、須臾振寒、汗出而解、〇陽毒及壞傷寒醫所不治、精魄已竭、心下尚煖、斡開其口、灌藥下咽卽活、右二方、出於朱肱活人書中〇今考更定、此方、當去亾硝

生脈散

麥門冬二錢 人參、五味子各一錢 夏月代熟水飲之、令人氣力湧出〇今考更定、此方、當去人參

樗根皮丸

樗根白皮爲末、酒糊和丸〇治夢遺 此藥性凉而燥不可單服 右二方、出於李梴醫學入門書中

二聖救苦丸

大黃四兩 猪牙皂角二兩 麪糊和丸菉豆大、五七十丸、一服卽汗、一汗卽愈〇此方、出於龔信萬病回春書中、治天行瘟疫

葛根解肌湯

葛根、升麻、黃芩、桔梗、白芷、柴胡、白芍藥、羌活、石膏各一錢 甘草五分〇治陽明病、目疼鼻乾不得臥〇今考夏定、此方、當去柴胡、芍藥、羌活、石膏、甘草

牛黃清心丸

山藥七錢 甘草炒五錢 人參、蒲黃、神麯並炒各二錢五分 犀角二

錢大豆黃卷炒肉桂阿膠炒各一錢七分白芍藥麥門冬黃芩當歸白朮防風朱砂水飛各一錢五分柴胡桔梗杏仁白茯苓川芎各一錢三分牛黃一錢二分羚羊角龍腦麝香各一錢雄黃八分白歛乾薑炮各七分金箔一百四十箔內四十箔爲衣大棗二十枚蒸取肉研爲膏右爲末棗膏入煉蜜和勻每一兩作十丸金箔爲衣每取一丸溫水和下○治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏憒言語蹇澁口眼喎斜手足不遂等證右二方出於龔信醫鑑書中○今考夏定此方當去白朮人參甘草神麴肉桂阿膠芍藥當歸川芎乾薑大棗清蜜柴胡茯苓雄黃朱砂

麻黃定喘湯

麻黃三錢杏仁一錢五分黃芩半夏桑白皮蘇子款冬花甘草各一錢白果去殼碎炒二十一箇○黃色歌曰諸病原來有藥方惟

愁齁喘最難當、病人遇此仙丹藥、服後方知定喘湯、此方出於龔信萬病回春書中、治哮喘神方○今考更定、此方、當去半夏、蘇子、甘草

新定太陰人病應用要藥二十四方

太陰調胃湯

薏苡仁、乾栗各三錢 蘿蔔子二錢 五味子、麥門冬、石菖蒲、桔梗、麻黃各一錢

葛根解肌湯

葛根三錢 黃芩、藁本各一錢五分 桔梗、升麻、白芷各一錢

調胃升清湯

薏苡仁、乾栗各三錢 蘿蔔子一錢五分 麻黃、桔梗、麥門冬、五味子、石菖蒲、遠志、天門冬、酸棗仁、龍眼肉、各一錢

清心蓮子湯

蓮子肉、山藥各二錢天門冬、麥門冬、遠志、石菖蒲、酸棗仁、龍眼肉、柏子仁、黃芩、蘿蔔子各一錢甘菊花三分

麻黃定喘湯

麻黃三錢杏仁一錢五分黃芩、蘿蔔子、桑白皮、桔梗、麥門冬、款冬花各一錢白果炒黃色二十一箇

麻黃定痛湯

薏苡仁三錢麻黃、蘿蔔子、各二錢杏仁、石菖蒲、桔梗、麥門冬、五味子、使君子、龍眼肉、柏子仁各一錢乾栗七箇

熱多寒少湯

葛根四錢黃芩、藁本各二錢蘿蔔子、桔梗、升麻、白芷各一錢

寒多熱少湯

薏苡仁三錢 蘿蔔子二錢 麥門冬、桔梗、黃芩、杏仁、麻黃各一錢 乾栗七箇

葛根承氣湯

葛根四錢 黃芩、大黃各二錢 升麻、桔梗、白芷各一錢

本方加大黃二錢則名曰葛根大承氣湯減大黃一錢則名曰葛根小承氣湯

調理肺元湯

麥門冬、桔梗、薏苡仁各二錢 黃芩、麻黃、蘿蔔子各一錢

麻黃發表湯

桔梗三錢 麻黃一錢五分 麥門冬、黃芩、杏仁各一錢

補肺元湯

麥門冬三錢 桔梗二錢五味子一錢

加山藥薏苡仁蘿蔔子各一錢則尤妙

鹿茸大補湯

鹿茸二三四錢麥門冬薏苡仁各一錢五分山藥天門冬五味子杏仁麻黃各一錢

虛弱人表症寒證多者宜用

拱辰黑元丹

鹿茸四五六兩山藥天門冬各四兩蟾蜍一二兩麝香五錢

煮烏梅肉爲膏和丸梧子大溫湯下五七十丸或燒酒下虛弱人裡症多者宜用

皂角大黃湯

升麻葛根各三錢大黃皂角各一錢

用之者不可過三四貼升麻三錢大黃皂角同局藥力峻猛故

也

葛根浮萍湯

葛根三錢蘿蔔子黃芩各二錢紫背浮萍大黃各一錢蠐螬十箇

治浮腫裡症熱多者宜用

乾栗蠐螬湯

乾栗百箇蠐螬十箇湯服或炙食黃栗蠐螬十箇作末別用黃栗湯水調下

治浮腫表症寒多者宜用

乾栗樗根皮湯

乾栗一兩樗根白皮三四五錢

治痢疾或湯服或丸服而丸服者或單用樗根白皮五錢

瓜蒂散

瓜蒂炒黃爲末 三五分 溫水調下或乾瓜蒂一錢急煎湯用

治卒中風臆膈格格有窒塞聲及目瞪者必可用此藥此病此證可用他病他證必不可用胃腹痛寒咳喘尤忌用雖滯食物不可用此藥而用他藥面色青白而素有寒證表虛者卒中風則當用熊膽散牛黃清心元石菖蒲遠志散而不可用瓜蒂散

熊膽散

熊膽三五分 溫水調下

麝香散

麝香三五分 溫水調下或溫酒調下只舉三五分則四分在其中

石菖蒲遠志散

遠志石菖蒲各一錢 猪牙皂角並末三分

溫水調下或遠志菖蒲末溫水調下皂角末吹鼻

麥門冬遠志散

麥門冬三錢 遠志、石菖蒲各一錢五味子五分
山藥七錢 蒲黃炒二錢五分 犀角二錢 大豆黃卷炒一錢七分 麥門冬、黃芩各一錢五分 桔梗、杏仁各一錢三分 牛黃一錢二分 羚羊角、龍腦、麝香各一錢 白斂七分 金箔七十箔內二十箔爲衣、烏梅二十枚蒸取肉研爲膏、右爲末、烏梅膏和勻、每一兩作二十丸金箔爲衣、每取一丸、溫水和下

右太陰人藥諸種、杏仁去雙仁去皮尖、麥門冬、遠志去心、白果、黃栗去殼、大黃或酒蒸或生用、鹿茸、皂角酥炙、酸棗仁、杏仁、白果炒用(舊本)

太陽人外感腰脊病論(以下舊本)

內經曰尺脈緩澁謂之解㑊○釋曰尺爲陰部肝腎主之緩爲熱中澁爲亾血故謂之解㑊解㑊者寒不寒熱不熱弱不弱壯不壯獰不可名謂之解㑊也

○靈樞曰髓傷則消爍脂疫體解㑊然不去矣不去謂不能行去也

○論曰此證卽太陽人腰脊病太重證也必戒澑哀遠嗔怒修清定然後其病可愈此證當用五加皮壯脊湯

○解㑊者上體完健而下體解㑊然脚力亦不甚弱此所以弱不弱壯不壯寒不寒熱不熱而其病爲腰脊病也有解㑊證者必無大惡寒發熱身體疼痛之證也太陽人若有大惡寒發熱身體疼痛之證則腰脊表氣充實也其病易治其人亦完健

太陽人內觸小腸病論

朱震亨曰噎膈反胃之病血液俱耗胃脘乾枯其枯在上近咽則水飲可行食物難入入亦不多名之曰噎其枯在下近胃則食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便秘少若羊屎然名雖不同病出一體又曰上焦噎膈食下則胃脘當心而痛須臾吐出食出痛乃止中焦噎膈食物可下難盡入胃良久復出下焦噎膈朝食暮吐暮食朝吐氣血俱虛者口中多出沫但見沫多出者必死大便如羊屎者難治不淡飲食者難治

○張鷄峯曰噎當是神思間病惟內觀自養可以治之

○龔信醫鑑曰反胃也膈也噎也受病皆同噎膈之證不屬虛不屬實不屬冷不屬熱乃神氣中一點病耳

○論曰此證卽太陽人小腸病太重證也必遠嗔怒斷厚味然後

其病可愈此證當用獼猴藤植腸湯又

○食物自外入而有所妨碍曰噎自內受而有所拒格曰膈朝食暮吐暮食朝吐曰反胃然朝食而暮吐暮食而朝吐者非全食皆吐也有所妨碍而拒格於胃之上口者經宿而自吐也則反胃亦噎膈也蓋噎膈者胃脘之噎膈也反胃者胃口之噎膈也同是一證也有噎膈證者必無腹痛腸鳴泄瀉痢疾之證也太陽人若有腹痛腸鳴泄瀉痢疾之證則小腸裡氣充實也其病易治其人亦完健又

○解佗噎膈俱是重證而重證之中有輕重之等級焉解佗而無噎膈則解佗之輕證也噎膈而無解佗則噎膈之輕證也若解佗兼噎膈噎膈兼解佗則其爲重險之證不可勝言而重險中又有輕重也太陽人解佗噎膈不至死境之前起居飲食如常人必易

之視以例病故入於危境而莫可挽回也余稟臟太陽人嘗得此病六七年嘔吐涎沫數十年攝身倖而免夭錄此以爲太陽人有病者戒若論治法一言蔽曰遠嗔怒而已矣

○太陽人意強而操弱意強則胃脘之氣上達而呼散者太過而越也操弱則小腸之氣中執而吸聚者不支而餒也所以其病爲噎膈反胃也

○問朱震亨論噎膈反胃曰血液俱耗胃脘乾枯食物難入其說如何曰水穀納於胃而脾衛之出於大腸而腎衛之脾腎者出納水穀之府庫而迭爲補瀉者也氣液呼於胃脘而肺衛之吸於小腸而肝衛之肺肝者呼吸氣液之門戶而迭爲進退者也是故少陽人大腸出水穀陰寒之氣不足則胃中納水穀陽熱之氣必盛也太陽人小腸吸氣液陰涼之氣不足則胃脘呼氣液陽溫之氣

必盛也胃脘陽溫之氣太盛則胃脘血液乾枯其勢固然也然非但乾枯而然也上呼之氣太過而中吸之氣太不支故食物不吸入而還呼出也

○或曰朱震亨所論噎膈反胃者安知非少陰少陽太陰人病而吾子必名目曰太陽人病內經所論解㑊者安知非少陰少陽太陰人病而吾子必名目曰太陽人病莫非牽強附會耶願聞其說

曰少陽人有嘔吐則必有大熱也少陰人有嘔吐則必有大寒也太陰人有嘔吐則必病愈也今此噎膈反胃不寒不熱非實非虛則此非太陽人病而何也解㑊者上體完健而下體解㑊然脈痠不能行去之謂也少陰少陽太陰人有此證則他證豐出而亦必無寒不寒熱不熱弱不弱壯不壯之理矣

○或曰吾子論太陽人解㑊病治法曰戒滾哀遠嗔怒修清定論

噎膈病治法曰遠嗔怒斷厚味意者太陽人解㑊病重於噎膈病而哀心所傷者重於怒心所傷乎曰否太陽人噎膈病太重於解㑊病而怒心所傷者太重於哀心所傷也太陽人哀心滾着則傷表氣怒心暴發則傷裡氣故解㑊表證以戒哀遠怒兼言之也曰然則少陽人怒性傷口脇胱氣哀情傷腎大腸氣少陰人樂性傷目膂氣喜情傷脾胃氣太陰人喜性傷耳腦餬氣樂情傷肺胃脘氣乎曰然

○太陽人大便一則宜滑也二則宜體大而多也小便一則宜多也二則宜數也面色宜白不宜黑肌肉宜瘦不宜肥鳩尾下不宜有塊塊小則病輕而其塊易消塊大則病重而其塊難消

本草所載太陽人病經驗要藥單方十種及李梴龔信經驗要藥單方二種

本草曰五加皮、治兩脚疼痺、骨節攣急痿躄、小兒三歲不能行、服此便行走

○松節、療脚軟弱

○木瓜、止嘔逆、煮汁飲之最佳

○葡萄根、止嘔噦、濃煎取汁、細細飲之佳

○獼猴桃、治熱壅反胃、取汁服之、藤汁至滑、主胃閉、吐逆、煎取汁服之甚佳

○蘆根、治乾嘔噎、及五噎煩悶、蘆根五兩、水煎頓服一升、不過三升即差

○蚌蛤、治反胃吐食

○鮸魚、治反胃

○蓴和鮸魚、作羹食之、主反胃、食不下止嘔

○蕎麥、實腸胃益氣力

○李梴曰杵頭糠、主噎食不下、咽喉塞、細糠一兩白粥清調服

○龔信曰蜘蛤、治反胃

新定太陽人病應用設方藥二方

五加皮壯脊湯

五加皮四錢木瓜、青松節各二錢葡萄根、蘆根、櫻桃肉各一錢蕎麥米半匙青松節闕材則以好松葉代之

右方治表證

獼猴藤植腸湯

獼猴藤四錢木瓜、葡萄根各二錢蘆根、櫻桃肉、五加皮、松花各一錢杵頭糠半匙獼猴桃闕材則以藤代之

右方治裏證

○凡菜果之屬、清平疏淡之藥、皆爲肝藥、蛤屬亦補肝、

○論曰藥驗、不廣者病驗、不廣故也、太陽人數、從古稀少、故古方書中所載證藥、亦稀少也、今此五加皮壯脊湯、獼猴藤植腸湯、立方、草草雖欠不博而若使太陽人有病者、因是二方、詳究其理而又變通置方、則何患乎無好藥哉、

廣濟說

初一歲至十六歲曰幼、十七歲至三十二歲曰少、三十三歲至四十八歲曰壯、四十九歲至六十四歲曰老、

○凡人幼年、好聞見而能愛敬、如春生之芽、少年好勇猛而能騰捷、如夏長之苗、壯年好交結而能修飭、如秋斂之實、老年好計策而能秘密、如冬藏之根、

○幼年好文字者、幼年之豪傑也、少年敬長老者、少年之豪傑也、

壯年能泛愛者壯年之豪傑也老年保可人者老年之豪傑也有好才能而又有十分快足於好心術者眞豪傑也有好才能而終不十分快足於好心術者才能而已

○幼年七八歲前聞見未及而喜怒哀樂膠着則成病也慈母宜保護之也少年二十四五歲前勇猛未及而喜怒哀樂膠着則成病也賢父能兄宜保護之也壯年三十八九歲前則賢弟良朋可以助之也老年五十六七歲前則孝子孝孫可以扶之也

○善人之家善人必聚惡人之家惡人必聚善人多聚則善人之臟氣活動惡人多聚則惡人之心氣強旺酒色財權之家惡人多聚故其家孝男孝婦受病

○好權之家朋黨比周敗其家者朋黨也好貨之家子孫驕愚敗其家者子孫也

○家凡事不成疾病連綿善惡相持其家將敗之地惟明哲之慈父孝子處之有術也

○嬌奢減壽懶怠減壽偏急減壽貪慾減壽

○爲人嬌奢必耽色爲人懶怠必嗜酒爲人偏急必爭權勢爲人貪慾必殉貨財

○簡約得壽勤幹得壽警戒得壽聞見得壽

○爲人簡約必遠色爲人勤幹必潔酒爲人警戒必避權勢爲人聞見必清貨財

○居處荒涼色之故也行身闕酒之故也用心煩亂權之故也事務錯亂貨之故也

○若敬淑女色得中道若愛良朋酒得明德若尚賢人權得正術若保窮民貨得全功

○酒色財權自古所戒謂之四堵墻而比之牢獄非但一身壽夭一家禍福之所繫也天下治亂亦在於此若使一天下酒色財權無乖戾之氣則庶幾近於堯舜周召南之世矣

○凡人簡約而勤幹警戒而聞見四材圓全者自然上壽簡約勤幹而警戒或聞見警戒而勤幹三材全者次壽嬌奢而勤幹警戒而貪慾或簡約而懶怠偏急而聞見二材全者恭敬則壽怠慢則夭

○凡人恭敬則必壽怠慢則必夭謹勤則必壽虛貪則必夭飢者之腸急於得食則腸氣蕩矣貪者之骨急於得財則骨力竭矣飢而安飢則腸氣有守貪而安貧則骨力有立是故飲食以能忍飢而不貪飽爲恭敬衣服以能耐寒而不貪溫爲恭敬筋力以能勤勞而不貪安逸爲恭敬財物以能謹實而不貪苟得爲恭敬

○山谷之人沒聞見而禍夭市井之人沒簡約而禍夭農畝之人沒勤幹而禍夭讀書之人沒警戒而禍夭

○山谷之人宜有聞見有聞見則福壽市井之人宜有簡約有簡約則福壽鄉野之人宜有勤幹有勤幹則福壽士林之人宜有警戒有警戒則福壽

○山谷之人若有聞見非但福壽也此人卽山谷之傑也市井之人若有簡約非但福壽也此人卽市井之傑也鄉野之人若有勤幹非但福壽也此人卽鄉野之傑也士林之人若有警戒非但福壽也此人卽士林之傑也

○或曰農夫元來力作最是勤幹者也而何謂沒勤幹士人元來讀書最是警戒者也而何謂沒警戒耶曰以百畝之不治爲己憂者農夫之任也農夫而比之士人則眞是懶怠者也士人頗讀書

也歷稽往牒天下之受病都出於妬賢嫉能天下之救病都出於好賢樂善故曰妬賢嫉能天下之多病也好賢樂善天下之大藥也

四象人辨證論

太少陰陽人以今時目見一縣萬人數大略論之則太陰人五千人也少陽人三千人也少陰人二千人也太陽人數絶少一縣中或三四人十餘人而已(印本)

○太陽人體形氣像腦偏之氣勢盛壯而腰圍之立勢孤弱少陽人體形氣像胷襟之包勢盛壯而膀胱之坐勢孤弱太陰人體形氣像腰圍之立勢盛壯而腦偏之起勢孤弱少陰人體形氣像膀胱之坐勢盛壯而胷襟之包勢孤弱

○太陽人性質長於疏通而材幹能於交遇少陽人性質長於剛

武而材幹能於事務太陰人性質長於成就而材幹能於居處少陰人性質長於端重而材幹能於黨與

○太陽人體形元不難辨而人數稀罕故最爲難辨也其體形腦顧之起勢強旺性質疏通又有果斷其病噎膈反胃解侈證亦自易辨而病未至重險之前別無大證完若無病壯健人也少陰人老人亦有噎證不可誤作太陽人治

○太陽女體形壯實而肝小胷窄子宮不足故不能生產以六畜玩理而太陽牝牛馬體形壯實而亦不生產者其理可推

○少陽人體形上盛下虛胷實足輕剽銳好勇而人數亦多四象人中最爲易辨

○少陽人或有短小靜雅外形恰似少陰人者觀其病勢寒熱仔細執證不可誤作少陰人治

○太陰少陰人體形或略相彷彿難辨疑似而觀其病證則必無不辨太陰人虛汗則完實也少陰人虛汗則大病也太陰人陽剛堅密則大病也少陰人陽剛堅密則完實也太陰人有胷膈怔忡證也少陰人有手足惋亂證也太陰人有目眥上引證又有目睛內疼證也少陰人則無此證也少陰人平時呼吸平均而間有一太息呼吸也太陰人則無此太息呼吸也太陰人瘧疾惡寒中能飲冷水少陰人瘧疾惡寒中不飲冷水太陰人脈長而緊少陰人脈緩而弱太陰人肌肉堅實少陰人肌肉浮軟太陰人容貌詞氣起居有儀而修整正大少陰人容貌詞氣體任自然而簡易小巧

○少陰人體形矮短而亦多有長大者或有八九尺長大者太陰人體形長大而亦或有六尺矮短者

○太陰人恆有怯心怯心寧靜則居之安資之深而造於道也怯

心益多則放心桎梏而物化之也若怯心至於怕心則大病作而怔忡也怔忡者太陰人病之重證也

○少陽人恆有懼心懼心寧靜則居之安資之深而造於道也懼心益多則放心桎梏而物化之也若懼心至於恐心則大病作而健忘也健忘者少陽人病之險證也

○少陰人恆有不安定之心不安定之心寧靜則脾氣即活也太陽人恆有急迫之心急迫之心寧靜則肝血即和也

○少陰人有咽喉證其病太重而爲緩病也不可等閑任置當用參桂八物湯或用獐肝金蛇酒

○太陽人有八九日大便不通證其病非殆證也不必疑惑而亦不可無藥當用獼猴藤五加皮湯

○太陽人小便旺多則完實而無病太陰人汗液通暢則完實而

無病五少陽人大便善通則完實而無病五少陰人飲食善化則完實而無病六

○太陽人噎膈則胃脘之上焦散溶如風太陰人痢病則小腸之中焦窒塞如霧少陽人大便不通則胃膈必如烈火少陰人泄瀉不止則臍下必如冰冷明知其人而又明知其證則應用之藥必無可疑六

○人物形容仔細商量再三推移又如有迷惑則參互病證明見無疑然後可以用藥最不可輕忽而一貼藥誤投重病險證一貼藥必殺人六

○華佗曰養生之術每欲小勞但莫大疲六

○有一老人曰人可日再食而不四五食也又不可既食後添食如此則必無不壽六

○余足之曰太陰人察於外而恆寧靜恪心少陽人察於內而恆寧靜懼心太陽人退一步而恆寧靜急迫之心少陰人進一步而恆寧靜不安定之心如此則必無不壽

○又曰太陽人恆戒怒心哀心少陽人恆戒哀心怒心太陰人恆戒樂心喜心少陰人恆戒喜心樂心如此則必無不壽

○大舜自耕稼陶漁無非取諸人以爲善夫子曰三人行必有我師以此觀之則天下衆人之才能聖人必博學審問而兼之故大而化也太少陰陽人識見才局各有所長文筆射御歌舞揖讓以至於博奕小技細鎖動作凡百做造面面不同皆異其妙儘乎衆人才能之浩多於造化中也

○靈樞書中有太少陰陽五行人論而略得外形未得臟理蓋太少陰陽人早有古昔之見而未盡精究也

○此書自癸巳七月十三日始作晝思夜度無頃刻休息至于翌年甲午四月十三日少陰少陽人論則略得詳備太陰太陽人論則僅成簡約蓋經驗未遍而精力已憊故也記曰開而不達則思若太陰太陽人思而得之則亦何損乎簡約哉

○萬室之邑一人陶則器不足也百家之村一人醫則活人不足也必廣明醫學家家知醫人人知病然後可以壽世保元

此書雖出今人之手實是千古醫家稀罕之書此書任古今之是非凌醫藥之樞軸雖一字誤書則為作文者之大累（新本）

光緒甲午四月十三日咸興李濟馬畢書于漢南山中

甲午畢書後乙未下鄉至于庚子因本改刊自醫源論至太陰人諸論各有增刪而其餘諸論未有增刪故並依新舊本刊行

卷一 嗅 맛흘 후 　蕩 흔 탕 　頷 턱 함 　臆 가슴 억 　綸 경륜 륜 　臍 배꼽 제 　檢 검속 할검 　伐 자랑 벌 　夸 자랑 과 　臀 볼기 둔 　懶 게으 를란

擅 오울 천 　罔 속일 망 　喧 의젓 할훤 　濫 넘칠 람 　探 더듬 을탐 　黠 던첨 할할 　鴟 솔개 치 　徙 오곰 사 　淨 맑끌 정 　激 충돌 할격 　宏 클 굉 　栗 견고 할률

畜 싸을 츅 　呼 숨내 쉴호 　吸 드리 쉴흡 　液 진액 액 　焦 마른 쵸 　乍 잠간 사 　脊 등마 루척 　頤 볼기 마긴 추나 　陶 화락 할요 　兜 투구 두 　沾 젖을 쳡 　做 지을 주

數 자주 삭 　腦 머리 골노 　膂 등심 려 　膀 오좀 통방 　便 편안 할편 　恢 넓을 회 　坦 평할 탄 　脘 밥통 완 　膈 흉격 격 　肛 밋구 멍항 　窄 좁을 착 　津 진액 진

膩 기름 질니 　滓 썩기 자 　膻 젓사 이단 　膜 홀데 기막 　筋 힘줄 근 　凝 엉길 응 　擁 옹위 할옹 　鍛 쇠익 일단 　耗 모손 할모 　爍 노길 삭 　瑩 정결 할형 　忖 헤아 릴촌

卷二 瞑 독할 명 　澆 물대 일요 　漓 흐를 리 　扁 걱을 편 　杲 날돗 을고 　梃 나무 결천 　詵 만을 선 　龐 성 방 　癥 적취 징 (俗癥) 　該 가촐 해 　疼 압흘 동

咽 목구 멍연 　眩 눈어 둘현 　秘 비밀 할비 　燥 마를 조 　縮 주구 러질축 　摭 주울 척 　昧 어두 울매 　嗌 목구 멍익 　譫 말망 령될섬 　幻 변화 할환 　嗇 린색 할색 　淅 쌀일 석

翕 합할 흡 　嘔 토할 구 　瘟 온역 온 　衂 코피 뉵 　硬 견강 할경 　瘖 숨막 힐비 　怕 두려 울파 　峻 놉흘 쥰 　怳 미칠 황 　惱 피로 울뇌 　嗽 잉치 할슈 　嚥 삼킬 연

噦 홰기 얼 　濈 화할 즙 　劇 심할 극 　摸 수탐 할막 　惕 우구 할척 　喘 숨찰 천 　濇 샐샐 할색 　縫 꾸여 맬봉 　撮 단견 할촬 　謾 소모 만 　瞤 눈섬 적일 슌 　壞 문어 질괴

涓 흐를 연 　俑 등신 용 　痺 각기 비 　拘 거릿 길구 　澁 생샐 할삽 　痰 담 담 　碗 사발 완 　懲 징계 징 　腫 종기 종 　歧 두갈 거리기 　撐 벗칠 탱 　噤 입닷 을금

躁 급할 조 　擾 요란 할요 　攣 수족 곱을련 　肘 팔뚝 주 　絞 급할 교 　脹 창자 창 　踡 페지 못할권 　睛 눈망 울정 　癱 편반 탄 　這 이 자 　聊 힘입 을료 　沫 거품 말

汆 쌋송 이다 　黯 검을 암 　憐 슬플 련 　怫 답답 할불 　悶 답답 할민 　綽 너그 러울작 　癘 염병 려 　緊 긴급 할긴 　疸 황달 단 　萎 마를 위 　溏 못 당 　瀦 웅덩 이저

節 질행 이공	涎 춤 연	癖 적병 벽	荏 심상 할심	腿 다리 퇴	疳 감질 감	卷四	恇 겁낼 광	㑭 감절 역	蕁 순채 순	蘋 정히 불오
卻 물너 칠각	剉 썰 좌	羸 파리 할리	斑 아롱 반	瘦 저릴 산	透 통할 할투	蠹 좀 두	甸 현 또	獰 녕악 할녕	蕎 모밀 교	甕 독 옹
壅 막흘 옹	蛭 거머리 질	祟 빌미 슈	愬 아리 쇼	鶻 매 골	疱 부루 포	稜 모 릉	涸 물자 할학	胻 종아 리행	蟛 게 방	妬 투기 할투
錮 금고 할고	蝱 등애 망	卷三	憒 심난 할궤	臂 팔 비	扛 들 강	垓 지경 해	皺 주롬 추	痲 저릴 마	捷 쌜을 첩	蓁 성할 진
脆 연할 취	熬 볶을 오	拖 쓰을 타	祛 물니 칠거	愎 강퍅 할퍅	瘥 병나 을채	凜 찰 름	癱 두루 반려어	噎 목삼 결열	氾 넘불 범	瓢 가버 울표
缸 병 항	稔 오을 님	淋 번지 를림	嚙 물 교	頰 뺨 협	燠 더울 욱	會 소경 맹	哮 설울 효	獼 원숭 이미	嬌 아리 울교	俛 위바 럭문
顆 덩이 과	沸 끌을 비	遍 두루 변	霎 잠간 삽	炷 심지 쥬	豉 된장 시	恇 가슴두 근거릴정	痲 림질 림	碍 방해 애	㖃 살몰 순	背 눈추 리자
膿 고름 농	暈 무리 운	擲 던질 쳑	痒 가려 올양	咬 물 교	脪 근심 할창	咯 꿩의 소리각	窒 막울 질	餧 주릴 뇌	闒 천할 답	矮 난장 이왜
詽 악혹 할아	煉 불닐 련	輾 누어 구을년	瘇 종긔 종	齦 닛몸 은	杵 공이 저	紋 문의 문	瞪 직시 할징	痿 각기 위	茸 풀초 할용	椌 착고 질
煆 불사 를하	搜 뒤질 수	叫 부를 규	纏 얼글 젼	贅 군살 취	麤 설걸 추	穰 번성 할양	腕 팔 완	躄 전 벽	錯 석길 착	梏 수갑 곡
砒 비상 비	擣 씨올 도	喝 입빗 구러질갈	肌 살 긔	苛 까다 로올가	耐 견딜 내	腮 뺨 싀	齁 콧숨 구	蚌 빕합 방	堵 담 도	豁 시원 할활
帣 쇡지 체	癥 적병 징	溯 거사 릴소	甛 달 쳠	泔 쌀쓰 물감	滌 씨슬 쳑	噴 자채 기분	酥 졋조 림소	鯽 부어 즉	牢 우리 로	懲 곤할 뵈

ㅁ 尹 ㄷ 夕 加 七 木 ㅅ 户 大 日 朩 丅 夊 寸 ㄱ 丿 亦 丶 卜 ㅅ 卩 厶 广 巨 ソ ノ 朵

고 나 니 다 더 저 든 라 려 로 리 며 면 作 시 애 어 여 이 와 애 은 의 저 거 하 조 히

昭和十五年八月三日許可
昭和十六年二月十日印刷
昭和十六年四月十日發行

（詳校懸吐東醫壽世保元）

（定價金貳圓）

咸興府昭和町二丁目四十六番地
編輯兼發行者　韓斗正

大田府榮町三丁目三十七番地
印刷者　李基福

大田府榮町一丁目二十六番地
印刷所　以文社

咸興府大和町四丁目七十六番地
發行所　金重瑞方